

- 2. 帘子藤 *P. laxiflora* (Bl.) O. Ktze.
 2. 花冠长 13 毫米, 开花时裂片向下反折; 花柱近基部加厚; 子房无毛
 3. 大花帘子藤 *P. grandiflora* Markgr.

1. 毛帘子藤(中国高等植物图鉴)

Pottisia pubescens Tsiang in Sinensia 3: 157, cum f. 1932, in Sunyatsenia 2: 171. 1934.

攀援灌木, 长达 5 米; 枝条密被铁锈色短柔毛; 茎皮褐色。叶椭圆形或近心形, 长 6—12 厘米, 宽 2.5—6.7 厘米, 叶面绿色, 被铁锈色短柔毛, 叶背淡绿色, 密被铁锈色短柔毛; 叶柄长 1—3.5 厘米, 密被铁锈色短柔毛。花多朵, 宽总状式聚伞花序三歧、腋生或顶生, 长 10—19 厘米, 宽 6—14 厘米; 总花梗 9—18 厘米, 被锈色短柔毛; 花梗长 5—7 毫米; 苞片和小苞片多数; 花萼短, 裂片宽卵圆形, 长约 1.5 毫米, 两面被短柔毛, 内面基部具 10 枚腺体; 花冠紫红色, 花冠筒圆筒形, 长 4.5 毫米, 外面被疏短柔毛, 内面毛较密, 花冠裂片宽卵形, 长 3 毫米, 宽 1.5 毫米, 顶端钝, 基部向右覆盖; 雄蕊着生在花冠筒的喉部, 花丝被长柔毛, 花药箭头状, 伸出花冠喉之外; 子房由 2 枚离生心皮组成, 被长柔毛, 长约 1 毫米, 花柱圆筒状, 中部和顶部加厚, 长 3.5 毫米, 柱头圆锥状, 长约 1 毫米; 花盘环状, 围绕子房, 顶端 5 裂至中部。蓇葖双生, 下垂, 线状圆柱形, 长 28—35 厘米, 直径 2—3 毫米, 外果皮有微毛及纵长的细条纹; 种子线状长圆形, 暗紫色, 长约 2 厘米, 直径 1.5 毫米, 顶端具白色绢质种毛, 种毛长约 3 厘米。花期 6—8 月, 果期 10 月—翌年 1 月。

产于广西、云南和贵州。生于海拔 500—840 米的山地疏林中或山谷向阳处、路旁灌木丛中。模式标本采自广西凌云。

2. 帘子藤(广西) 黄心泥藤(广东新兴); 长果胶藤(广东封川); 山羊角(广东五华); 亚八藤(广东海南澄迈); 腰骨藤(广东海南万宁); 笔须藤(广东海南澄迈); 厚皮藤(广东海南儋县); 钩婆藤(广东海南儋县); 坭藤母(广东海南临高); 乳汁藤(广西上思、广东海南临高); 火烧角(广东海南兴隆); 花拐藤(广西); 能藤(广西苍梧); 蚂蝗藤(广西桂平); 红杜仲藤(广西) 图版 46

Pottisia laxiflora (Bl.) O. Ktze. Rev. Gen. Pl. 1: 416. 1891; Merr. in Philip. Journ. Sci. 21: 507. 1922, et in Lingnan Sci. Journ. 5: 151. 1927; Tsiang in Sunyatsenia 2: 171. 1934, 静生汇报, 9: 29. 1939; 中国高等植物图鉴, 3: 439, 图 4832. 1974; 海南植物志, 3: 251, 图 699. 1974. ——*Vallaris laxiflora* Bl. Bijdr. 1043. 1826. ——*Pottisia cantonensis* Hook. et Arn. Bot. Beech. Voy. 198, t. 43. 1836. ——