

29. 罗布麻属*——*Apocynum* Linn.

Linn. Sp.Pl. ed. 1: 213. 1753, et Gen. Pl. ed. 5: 101. 1754; A. DC. Prodr. 8: 439. 1844; Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 2: 716. 1876; K. Schum. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4, 2: 179. 1895; Woodson in Ann. Missouri Bot. Gard. 17: 83. 1930; Tsiang et P. T. Li in Acta Phytotax. Sinica 11: 375. 1973.——*Trachomitum* Woodson, l. c. 157.

直立半灌木,具乳汁;枝条对生或互生。叶对生,稀近对生或互生,具柄,叶柄基部及腋间具腺体。圆锥状聚伞花序一至多歧,顶生或腋生;花萼5裂,双盖覆瓦状排列(开花后镊合状排列),内面无腺体;花冠圆筒状钟形,整齐,5裂,裂片的基本在花蕾时向右覆盖,花冠筒内面基部具副花冠,裂片5枚,离生(美洲种)或基部合生;雄蕊5枚,着生于花冠筒基部,与副花冠裂片互生,花药箭头状,基部具耳,顶端渐尖,隐藏在花喉内,花药背面隆起,腹面中部粘生在柱头基部;雌蕊1枚,柱头基部盘状,顶端钝,2裂,花柱短,子房半下位,由2枚离生心皮所组成,胚珠多数,着生在子房的腹缝线侧膜胎座上;花盘环状,肉质,其裂片离生或基部合生,环绕子房,着生在花托上。蒴果2,平行或叉生,细而长,圆筒状;种子多数,细小,顶端具有一簇白色绢质的种毛;胚根在上。

全世界约14种,我国产1种,分布于西北、华北、华东及东北各省区。国外广布于北美洲、欧洲及亚洲的温带地区。

本属模式种为: *Apocynum cannabinum* Linn.

本属有人将它细分成三属,即 *Apocynum* L., *Poacynum* Baill. (1888), *Trachomitum* Woodson (1930)。我们认为 *Apocynum* L. 与 *Poacynum* Baill. 分开是合理的。因为 *Apocynum* L. 属的叶是对生,花冠筒的下部圆筒状,上部为近钟状。*Poacynum* Baill. 属的叶是互生,稀对生,花冠是骨盆状等显著而固定的不同特征。至于与 *Trachomitum* Woodson 分开,我们认为是不合理的,也是不科学的。我们曾将北美洲与欧、亚洲标本作了研究比较,觉得 *Trachomitum* Woodson 属的特征实在是不稳定,同时创立该属时有些特征是错误的。故我们将 *Trachomitum* Woodson 属归并。

罗布麻(董正钧著罗布麻) 茶叶花(河北、陕西、甘肃);野麻(新疆、青海、甘肃);泽漆麻、女儿茶(江苏);茶棵子(山东);奶流(山西);红麻、红花草(陕西);吉吉麻(江

* 罗布麻属(新疆罗布麻),别名茶叶花属(种子植物名称),草夹竹桃属(中国种子植物科属辞典)。