

脉凸起,侧脉扁平,侧脉每边 7—10 条,斜上升。聚伞花序顶生,着花 9—15 朵,长和直径约 10 厘米;花梗长 0.5—1.6 厘米;花蕾长圆筒形,顶端钝;花萼裂片线状披针形,比花冠筒长,长 1.5—2.0 厘米,宽 1.5—3 毫米,花萼内面基部具 5 枚腺体;花冠白色,芳香,花冠筒圆筒形,基部膨大,顶端收缩,长 0.7—1.2 厘米,宽约 2.5 毫米,外面被短柔毛,内面在雄蕊背部花冠筒上至喉部被长柔毛,裂片长镰刀形,顶端渐尖,长 1.5—2.0 厘米,宽 4—6 毫米;雄蕊着生在花冠筒基部,长 6 毫米,宽 1.5 毫米,花丝短,被长柔毛,花药箭头状,内藏,顶端渐尖,基部具耳,腹部粘生在柱头上;子房被柔毛,由 2 枚离生心皮组成,花柱短,柱头圆锥状;每心皮有胚珠多颗。蓇葖未见。花期 5—6 月。

产于广西和云南。生于海拔 300—1300 米的山地密林中或疏林沟谷潮湿处,常攀援在树上或灌木丛中。模式标本采自广西大明山。

全株可作药用,有治水肿之效。

4. 海南香花藤(海南植物志)

Aganosma schlechteriana Lév. in Fedde Repert. Sp. Nov. 9: 325. 1911, et Fl. Kouy-Tchéou 40. 1914; Tsiang in Sunyatsenia 4: 31, fig. 8. 1939; 中国高等植物图鉴, 3: 449, 图 4851. 1974; 海南植物志, 3: 240, 图 688. 1974. — *Aganosma cymosa* auctt., non (Roxb.) G. Don: Woods. in Journ. Arn. Arb. 15: 315. 1934; Rehd. op. cit. 18: 237. 1937; Tsiang in Sunyatsenia 2: 154. 1934. — *Aganonerium polymorphum* auctt., non Pierre: Merr. in Lingnan Sci. Journ. 6: 330. 1928. — *Aganosma odora* Tsiang in Sunyatsenia 2: 154, Pl. 29. 1934. — *Aganosma radiata* Merr. in Lingnan Sci. Journ. 14: 51, f. 17. 1935.

4a. 海南香花藤(原变种) 图版 62

Aganosma schlechteriana Lév. var. **schlechteriana**

攀援灌木,长达 7 米;枝条幼时被短柔毛,老时渐脱落,具乳汁。叶椭圆形至长圆状椭圆形,稀卵圆形,顶端急尖至钝或渐尖,基部阔楔形,长 6—14 厘米,宽 2.5—5.5 厘米,幼时被绒毛,老时毛渐脱落;侧脉每边约 10 条,斜曲上升;叶柄长约 1 厘米。聚伞花序顶生,三歧,长 4—6 厘米,宽约 6 厘米;总花梗、花梗、苞片、花萼、花冠外面被黄色的短柔毛;花萼裂片卵圆形,比花冠筒长,长 10—12 毫米,宽 2.5—4 毫米,花萼

图版 61 香花藤 *Aganosma acuminata* (Roxb.) G. Don, 1.花枝; 2.花冠展开,示雄蕊着生; 3.花萼展开,示腺体; 4.雌蕊及花盘; 5.蓇葖; 6.种子。(李秉滔绘)