

.....8. 漾濞鹿角藤 *C. griffithii* Hook. f.

1. 大叶鹿角藤(中国高等植物图鉴)

Chonemorpha macrophylla G. Don, Gen. Hist. **4**: 76. 1837 (typ. cons. Int. Cod. Bot. Nom. 351. 1972); Wight, Ic. Pl. Ind. Or. **2**: t. 432. 1843; A. DC. Prodr. **8**: 432. 1844; Kurz, For. Fl. Brit. Burma **2**: 187. 1877; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **3**: 661. 1882; Coll. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. **28**: 86. 1890; Tsiang in Sunyatsenia **3**: 152. 1936.——*Echites fragrans* Moon, Cat. 20. 1821.——*Chonemorpha fragrans* Alston in Ann. Per. **11**: 203. 1929, Suppl. Handb. Fl. Ceyl. 192. 1931; Bakh. f. in Blumea **4**: 388. 1950; Back. et Bakh. f. Fl. Java **2**: 239. 1965.

粗壮木质大藤本,高攀大树上,具丰富乳汁;茎和枝条粗糙,具小瘤状凸起;除花外全株被粗硬毛。叶大,纸质,近圆形或宽卵形,长13—26厘米,宽10—20厘米,顶端圆,具短尖头,基部心形,老叶叶面被毛渐脱落;侧脉每边10—12条,弯拱上升至叶缘网结;叶柄长1—5厘米。聚伞花序顶生,总花梗和花梗均生有苞片和小苞片;花萼具明显的萼筒,长约1厘米,直径5—7毫米,顶端成齿裂,几无毛;花大,直径5—8厘米,白色,近高脚碟状,花冠筒圆筒状,长3厘米,基部膨大,外面无毛,内面喉部被长柔毛,花冠裂片倒卵形,向右覆盖;雄蕊着生于花冠筒近基部,花药箭头状,包围柱头,腹部粘生在柱头上,花丝被短柔毛。蓇葖叉生,长圆状披针形,长达30厘米,直径2厘米;种子长圆形,基部较宽,顶端具白色绢质种毛;种毛长约5厘米。花期5—7月,果期秋冬季。

云南和广西野生。生于山地阔叶密林中较潮湿地方,攀援树上;广东栽培。斯里兰卡、印度、缅甸、马来西亚和印度尼西亚等均有分布。本种模式标本采自印度。

2. 小花鹿角藤(植物分类学报) 图版 67

Chonemorpha parviflora Tsiang et P. T. Li in Acta Phytotax. Sinica **11**: 389, Pl. 52. 1973.

粗壮大藤本,有乳汁;茎粗糙,淡褐色;枝条、小枝、叶、叶脉和叶柄均密被黄色长粗毛。叶膜质,椭圆形,长13—21.5厘米,宽6—11.5厘米,顶端急尖,基部宽楔形;中脉和侧脉在叶面扁平,在叶背凸起,侧脉每边10—12条,弯拱上升至叶缘网结,网脉很多,横结;叶柄长1.4—2厘米,近扁平。聚伞花序顶生,花梗长1厘米,被柔毛;花

图版 66 小花藤 *Microchites polyantha* (Bl.) Miq., 1.花枝; 2.花; 3.花冠筒展开,示雌蕊和雄蕊; 4.蓇葖; 5.种子。(吴翠云仿绘)