

萼合生成筒状,长1.5厘米,宽8毫米,顶端5齿,外面被柔毛,内面无毛,基部有5个腺体;花冠高脚碟状,无毛,花冠筒圆筒状,长2.8厘米,宽1厘米,顶端截形;雄蕊长7毫米,着生于花冠筒的近基部,花药箭头状,基部具耳;花盘环状;雌蕊长5毫米,子房由2枚离生心皮所组成,一半埋藏在花盘内,被长柔毛,花柱丝状,具长柔毛,柱头棒状,顶端具细尖头,胚珠在每室多颗。蓇葖2个,离生,线状披针形,顶端渐尖,长24—25.5厘米,直径约1厘米,外面被柔毛;种子匙形,扁平,长2.2厘米,基部宽5毫米,顶端具长喙;种毛淡褐色,绢质,长5厘米。花期5—8月,果期8—12月。

产于广西南部。生于山地杂木林中。模式标本采自上思。

3. 丛毛鹿角藤(植物分类学报) 图版68

Chonemorpha floccosa Tsiang et P. T. Li in Acta Phytotax. Sinica 11: 387, Pl. 51. 1973.


粗壮大藤本;茎暗黄色,粗糙,有瘤状凸起;枝条、小枝及叶均密被黄色丛卷毛。叶厚纸质,倒卵圆形,长10—14厘米,宽6—10厘米,顶端浑圆,有小尖头;中脉和侧脉在叶面扁平,在叶背凸起,侧脉每边约10条,弯拱上升至叶缘网结,网脉横结;叶柄长1.2—1.5厘米。聚伞花序顶生;花萼筒状,长1厘米,宽5毫米,外面被短柔毛,内面无毛,基部有5个腺体;花冠高脚碟状,无毛,花冠筒圆筒状,长2厘米,直径2毫米,花冠裂片倒三角形,长1.7厘米,宽9毫米;雄蕊近花冠筒的基部着生,花药箭头状,长6毫米,基部具耳;花盘环状,顶端有凹缺;子房和花柱被黄色刚毛,柱头膨大,顶部五角形,胚珠在每室多颗。蓇葖线状披针形,长34.5厘米,直径1厘米,外面被黄色密柔毛;种子匙形,扁平,长2.5厘米,宽5毫米,顶端具白色绢质种毛;种毛长4厘米。花期5—8月,果期8—12月。

产于广西南部。生于山地杂木林中。模式标本采自上思。

4. 海南鹿角藤(海南植物志) 图版69

Chonemorpha splendens Chun et Tsiang in Sunyatsenia 2: 157, Pl. 30. 1934, in Acta Phytotax. Sinica 10: 31. 1965; 中国高等植物图鉴, 3: 450, 图4854. 1974; 海南植物志, 3: 247, 图694. 1974.

粗壮木质藤本,具乳汁;小枝、总花梗,叶背和花萼筒被淡黄色短绒毛。叶近革质,宽卵形或倒卵形,长18—20厘米,宽12—14厘米。聚伞花序总状式,连总花梗长达35厘米,下段总状式,小苞片甚多,上段伞房状,着花9—13朵;花萼筒状,长15—18毫米,顶端不规则两唇形,每唇具2—3个小齿;花冠淡红色,裂片展开直径4厘米;雄蕊着生于花冠筒基部之上;花盘环状,顶端5浅裂。蓇葖近平行,向端部渐狭,



图版 68 丛毛鹿角藤 *Chonemorpha floccosa* Tsiang et P. T. Li, 1.花枝; 2.花; 3.花冠筒展开, 示雄蕊着生; 4.花萼展开, 示腺体着生; 5.花萼腺体 1 个; 6.雄蕊腹面观; 7.雌蕊; 8.蓇葖; 9.种子。(陈国泽绘)