

长 25 厘米,幼时被短绒毛,毛老时渐落;种子扁平,瓶形,端部紧缩,基部圆形;种毛白色绢质,长 5 厘米。 花期 5—7 月,果期 8 月—翌年 1 月。

产于广东(海南)和云南。生于山谷中或疏林中。模式标本采自广东海南。

植株含胶乳,可制一般日常橡胶制品。

5. **长萼鹿角藤**(中国高等植物图鉴) 藤仲、土杜仲、大杜仲、金丝杜仲、银丝杜仲(云南)

Chonemorpha megacalyx Pierre in Spir. Caout. Indo-Chine 75. 1906; Pitard in Lec. et Humb. Fl. Gén. Indo-Chine 3: 1250. 1933; 中国高等植物图鉴, 3: 451. 图 4855. 1974.

粗壮木质藤本,长 15—20 米,全株各部多被棕黄色绒毛,折断有白色乳汁流出。叶倒卵形至卵状椭圆形,长 17—29 厘米,宽 11—22 厘米,顶端急尖,基部圆形,叶面近无毛,叶背密被棕黄色绒毛;侧脉每边 8—12 条;叶柄短,被棕黄色绒毛。花红色,组成聚伞花序,顶生;花冠近高脚碟状;总花梗被长硬毛,下段无小苞片;花萼具明显的萼筒,长 2—2.2 厘米,被绒毛,顶端花萼裂片短;花冠裂片向右覆盖,展开直径 4 厘米以上。蓇葖 2,叉开,圆柱形,长 16—34 厘米,宽 2 厘米;种子扁平,顶端有丝状长种毛。 花期春夏季,果期秋冬季。

产于云南南部。生于海拔 900—1500 米山地林边、山坡、沟谷向阳处。老挝也有。模式标本采自老挝。

茎藤供药用,云南民间有用来治风湿性腰腿痛、肾亏腰痛、高血压、骨折、跌打损伤;种毛可外敷止血。植株绒毛接触皮肤会引起痛痒。

6. **鹿角藤**(华南) 毛柱鹿角藤、黄藤(广西) 图版 70

Chonemorpha eriostylis Pitard in Lec. et Humb. Fl. Gén. Indo-Chine 3: 1247. 1933; Chatt. in Kew Bull. 1947: 48. 1947; 中国高等植物图鉴, 3: 451, 图 4856. 1974.

粗壮木质大藤本,长达 20 米,除花冠和叶面外均被粗长毛,具丰富乳汁。叶倒卵形或宽长圆形,长 12—25 厘米,宽 7—15 厘米;侧脉每边 9—11 条。聚伞花序长 12 厘米,着花 7—15 朵;花萼筒状,被绒毛,内面基部具腺体;花冠白色,近高脚碟状,花冠筒内面具毛 5 行,裂片展开直径约 4 厘米;雄蕊着生在花冠筒的近基部,花药箭头状,花丝短,被微毛;花盘环状,顶端波状,比子房长;子房 2 心皮离生,无毛,花柱被长硬毛。蓇葖 2 枚,近木质,箸状披针形,端部渐尖,外果皮被黄褐色茸毛,长 25—40 厘米,宽 1.5—2 厘米;种子倒卵形,扁平,端部渐尖,基部圆形,长 2.6 厘米,宽 8 毫米;种