

长 25 厘米,幼时被短绒毛,毛老时渐落;种子扁平,瓶形,端部紧缩,基部圆形;种毛白色绢质,长 5 厘米。 花期 5—7 月,果期 8 月—翌年 1 月。

产于广东(海南)和云南。生于山谷中或疏林中。模式标本采自广东海南。

植株含胶乳,可制一般日常橡胶制品。

5. **长萼鹿角藤**(中国高等植物图鉴) 藤仲、土杜仲、大杜仲、金丝杜仲、银丝杜仲(云南)

Chonemorpha megacalyx Pierre in Spir. Caout. Indo-Chine 75. 1906; Pitard in Lec. et Humb. Fl. Gén. Indo-Chine 3: 1250. 1933; 中国高等植物图鉴, 3: 451. 图 4855. 1974.

粗壮木质藤本,长 15—20 米,全株各部多被棕黄色绒毛,折断有白色乳汁流出。叶倒卵形至卵状椭圆形,长 17—29 厘米,宽 11—22 厘米,顶端急尖,基部圆形,叶面近无毛,叶背密被棕黄色绒毛;侧脉每边 8—12 条;叶柄短,被棕黄色绒毛。花红色,组成聚伞花序,顶生;花冠近高脚碟状;总花梗被长硬毛,下段无小苞片;花萼具明显的萼筒,长 2—2.2 厘米,被绒毛,顶端花萼裂片短;花冠裂片向右覆盖,展开直径 4 厘米以上。蓇葖 2,叉开,圆柱形,长 16—34 厘米,宽 2 厘米;种子扁平,顶端有丝状长种毛。 花期春夏季,果期秋冬季。


产于云南南部。生于海拔 900—1500 米山地林边、山坡、沟谷向阳处。老挝也有。模式标本采自老挝。

茎藤供药用,云南民间有用来治风湿性腰腿痛、肾亏腰痛、高血压、骨折、跌打损伤;种毛可外敷止血。植株绒毛接触皮肤会引起痛痒。

6. **鹿角藤**(华南) 毛柱鹿角藤、黄藤(广西) 图版 70

Chonemorpha eriostylis Pitard in Lec. et Humb. Fl. Gén. Indo-Chine 3: 1247. 1933; Chatt. in Kew Bull. 1947: 48. 1947; 中国高等植物图鉴, 3: 451, 图 4856. 1974.

粗壮木质大藤本,长达 20 米,除花冠和叶面外均被粗长毛,具丰富乳汁。叶倒卵形或宽长圆形,长 12—25 厘米,宽 7—15 厘米;侧脉每边 9—11 条。聚伞花序长 12 厘米,着花 7—15 朵;花萼筒状,被绒毛,内面基部具腺体;花冠白色,近高脚碟状,花冠筒内面具毛 5 行,裂片展开直径约 4 厘米;雄蕊着生在花冠筒的近基部,花药箭头状,花丝短,被微毛;花盘环状,顶端波状,比子房长;子房 2 心皮离生,无毛,花柱被长硬毛。蓇葖 2 枚,近木质,箸状披针形,端部渐尖,外果皮被黄褐色茸毛,长 25—40 厘米,宽 1.5—2 厘米;种子倒卵形,扁平,端部渐尖,基部圆形,长 2.6 厘米,宽 8 毫米;种



图版 70 鹿角藤 *Chonemorpha eriostylis* Pitard, 1.花枝; 2.花冠筒展开; 3.雌蕊和花盘展开; 4.花萼筒展开,示腺体; 5.蓇葖; 6.种子。(陈国泽绘)

毛白色绢质,长7厘米。花期5—7月,果期8月—翌年4月。

产于云南、广西和广东。生于疏林山地及湿润山谷中。越南也有分布。模式标本采自越南。

植株皮层、叶及果均含胶乳,可制一般日常橡胶制品。老茎供药用,广西民间有治妇女黄疸。

7. 毛叶藤仲(云南) 刹抢龙喃(傣语) 图版 71

Chonemorpha valvata Chitt. in Kew Bull. 1947: 51. 1947; 中国高等植物图鉴, 3:452, 图 4857. 1974.

粗壮木质藤本;幼枝被黄色短柔毛,小枝皮孔不明显;全株各部折断有白乳汁流出。叶对生,大,宽卵形或近圆形,长15—30厘米,宽10—20厘米,顶端急尖或浑圆,基部圆形,叶背被短柔毛;叶脉明显。聚伞花序顶生;花淡红色;花萼5裂至基部,裂片镊合状排列,内面基部具齿状腺体;花冠近高脚碟状,花冠筒内面密被柔毛,裂片倒三角形,长4厘米,顶端宽4厘米,向右覆盖;雄蕊着生花冠筒的中部,花药箭头状,花丝被微柔毛;花盘环状,顶端浅裂,比子房短;子房由2枚离生心皮组成,花柱丝状,顶端被微毛。蓇葖双生并行;种子扁平,顶端有长绢质种毛。花期春夏季,果期秋冬季。

产于云南西南部。生于海拔900—1600米山地密林中、沟谷阴湿地方。缅甸、泰国也有。模式标本采自缅甸。

茎供药用,在云南民间有用来治骨折筋伤、风湿骨痛和外伤出血等。

8. 漾濞鹿角藤(中国高等植物图鉴)

Chonemorpha griffithii Hook. f. Fl. Brit. Ind. 3: 662. 1882; Chitt. in Kew Bull. 1947: 49. 1947.

高攀援木质藤本,具丰富乳汁,除花外,全株被粗硬毛,枝条被毛渐脱落,老时几无毛,具皮孔。叶椭圆形或倒卵形,长12—26厘米,宽7—17厘米,顶端圆形,有小尖头,基部宽楔形;侧脉10—12条,弯拱斜升至叶缘网结;叶柄长1.5—5厘米。聚伞花序顶生;花萼5裂至萼筒中部,裂片覆瓦状排列,其余与属特征相同。蓇葖长圆筒形,长34厘米,直径1.2厘米;种子顶端具白色绢质种毛。花期夏季,果期秋冬季。

产于云南西南部。生于山地密林中。分布于印度、锡金、尼泊尔等。模式标本采自印度。