

毛白色绢质,长7厘米。花期5—7月,果期8月—翌年4月。

产于云南、广西和广东。生于疏林山地及湿润山谷中。越南也有分布。模式标本采自越南。

植株皮层、叶及果均含胶乳,可制一般日常橡胶制品。老茎供药用,广西民间有治妇女黄疸。

7. 毛叶藤仲(云南) 刹抢龙喃(傣语) 图版 71

Chonemorpha valvata Chitt. in Kew Bull. 1947: 51. 1947; 中国高等植物图鉴, 3:452, 图 4857. 1974.

粗壮木质藤本;幼枝被黄色短柔毛,小枝皮孔不明显;全株各部折断有白乳汁流出。叶对生,大,宽卵形或近圆形,长15—30厘米,宽10—20厘米,顶端急尖或浑圆,基部圆形,叶背被短柔毛;叶脉明显。聚伞花序顶生;花淡红色;花萼5裂至基部,裂片镊合状排列,内面基部具齿状腺体;花冠近高脚碟状,花冠筒内面密被柔毛,裂片倒三角形,长4厘米,顶端宽4厘米,向右覆盖;雄蕊着生花冠筒的中部,花药箭头状,花丝被微柔毛;花盘环状,顶端浅裂,比子房短;子房由2枚离生心皮组成,花柱丝状,顶端被微毛。蓇葖双生并行;种子扁平,顶端有长绢质种毛。花期春夏季,果期秋冬季。

产于云南西南部。生于海拔900—1600米山地密林中、沟谷阴湿地方。缅甸、泰国也有。模式标本采自缅甸。


茎供药用,在云南民间有用来治骨折筋伤、风湿骨痛和外伤出血等。

8. 漾濞鹿角藤(中国高等植物图鉴)

Chonemorpha griffithii Hook. f. Fl. Brit. Ind. 3: 662. 1882; Chitt. in Kew Bull. 1947: 49. 1947.

高攀援木质藤本,具丰富乳汁,除花外,全株被粗硬毛,枝条被毛渐脱落,老时几无毛,具皮孔。叶椭圆形或倒卵形,长12—26厘米,宽7—17厘米,顶端圆形,有小尖头,基部宽楔形;侧脉10—12条,弯拱斜升至叶缘网结;叶柄长1.5—5厘米。聚伞花序顶生;花萼5裂至萼筒中部,裂片覆瓦状排列,其余与属特征相同。蓇葖长圆筒形,长34厘米,直径1.2厘米;种子顶端具白色绢质种毛。花期夏季,果期秋冬季。

产于云南西南部。生于山地密林中。分布于印度、锡金、尼泊尔等。模式标本采自印度。



图版 71 毛叶藤仲 *Chonemorpha valvata* Chatterjee, 1.花枝; 2.花冠筒展开,示雄蕊着生;
3.花萼展开; 4.雌蕊及花盘; 5.蓇葖。(陈国泽绘)