

西、甘肃、宁夏等省区。常生于山野岩石上和攀伏在墙壁或树上。模式标本采自江苏南京。

根、茎、叶供药用,作强壮剂和镇痛药,并有解毒之效。

6c. 变色络石(中国高等植物图鉴)

Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem. cv. **Variegatum**——*T. jasminoides* (Lindl.) Lem. var. *variegatum* Miller in Bailey, Cycl. Hort. **3**: 3362. 1927; Tsiang in Sunyatsenia **2**: 146. 1934; Bailey et al. Hort. Sec. 735. 1941.

本栽培变种的区别,在于叶圆形,杂色,具有绿色和白色,以后变成淡红色。花期春末至夏中。

我国广东南部有栽培。

叶的颜色多种,美丽,供观赏用。

7. 紫花络石(峨眉植物图志) 车藤(广西) 图版 76

Trachelospermum axillare Hook. f. Fl. Brit. Ind. **3**: 668. 1882; Diels in Engl. Bot. Jahrb. **29**: 540. 1900; Lév. Fl. Kouy-Tchéou 31. 1914; Schneid. in Sargent, Pl. Wils. **3**: 335. 1916; Chun in Sunyatsenia **1**: 298. 1934; Tsiang op. cit. **2**: 148, fig. 16. 1934; Woods. in Journ. Arn. Arb. **15**: 310. 1934, in Sunyatsenia **3**: 99. 1936; Tsiang op. cit. **3**: 145. 1936, 静生汇报, **9**: 25. 1939, in Fang, Ic. Pl. Omei **1**: Pl. 90. 1944; 陈嵘,中国树木分类学补遗, 19. 1935.——*Melodinus chaffanjoni* Lév. in Fedde Rep. Sp. Nov. **2**: 114. 1906.——*Maesa scandens* Lév. op. cit. **10**: 375. 1912.——*Periploca astacus* Lév. Fl. Kouy-Tchéou 43. 1914.

粗壮木质藤本,无毛或幼时具微长毛;茎直径1厘米,具多数皮孔。叶厚纸质,倒披针形或倒卵形或长椭圆形,长8—15厘米,宽3—4.5厘米,先端尖尾状,顶端渐尖或锐尖,基部楔形或锐尖,稀圆形;侧脉多至15对,在叶背明显;叶柄长3—5毫米。聚伞花序近伞形,腋生或有时近顶生,长1—3毫米;花梗长3—8毫米;花紫色;花蕾顶端钝;花萼裂片紧贴于花冠筒上,卵圆形、钝尖,内有腺体约10枚;花冠高脚碟状,花冠筒长5毫米,花冠裂片倒卵状长圆形,长5—7毫米;雄蕊着生于花冠筒的基部,花药隐藏于其内;子房卵圆形,无毛,花柱线形,柱头近头状;花盘的裂片与子房等长。蓇葖圆柱状长圆形,平行,粘生,无毛,向端部渐狭,略似镰刀状,通常端部合生,老时略展开,长10—15厘米,直径10—15毫米;外果皮无毛,具细纵纹;种子暗紫色,倒卵状长圆形或宽卵圆形,端部钝头,长约15毫米,宽7毫米;种毛细丝状,长约5厘米。花期5—7月,果期8—10月。