

40. 腰骨藤属*——*Ichnocarpus* R. Br.

R. Br. Mem. Wern. Soc. 1: 61. Apr. 1810.

木质藤本，具乳汁。叶对生。花多朵组成顶生或腋生的总状聚伞花序；花萼5裂，内面的腺体有或无；具很多小苞片；花冠高脚碟状，花冠筒喉部稍缩小，被柔毛，无副花冠，花冠裂片5枚，长圆形，向右覆盖；雄蕊5枚，着生在花冠筒中部或稍下，花药箭头状，内藏而不伸出花喉外，基部具耳；花盘5深裂，或5浅裂，通常比子房长；花柱短，柱头圆锥状；子房由2枚离生心皮组成，被毛，胚珠多颗。蓇葖双生，叉开，近圆箸状，一长一短；种子顶端具种毛。

约18种，分布于中国、印度、马来西亚和大洋洲。我国产2种、2变型，分布于广东、广西、云南等省区。

本属模式种为：*Ichnocarpus frutescens* (L.) W. T. Aiton

分种检索表

1. 小枝、叶背、叶柄及总花梗无毛，仅幼枝上被短柔毛或枝条和叶背被短柔毛；花白色，花序长3—8厘米；花萼腺体时有时无；花盘5深裂，长过子房；蓇葖外皮被短柔毛 1. 腰骨藤 *I. frutescens* (L.) W. T. Aiton
2. 枝条和叶背无毛 1a. 腰骨藤(原变型) *I. frutescens* (L.) W. T. Aiton f. *frutescens*
2. 枝条和叶背密被短柔毛 1b. 毛叶腰骨藤 *I. frutescens* (L.) W. T. Aiton f. *pubescens* Markgr.
1. 小枝、叶背、叶柄及总花梗被锈色绒毛；花红色；花序仅长1.5厘米；花萼腺体多数；花盘5浅裂，其顶端短于子房；蓇葖外皮被锈色绒毛 2. 少花腰骨藤 *I. oliganthus* Tsiang

1. 腰骨藤(华南) 犁田公藤、羊角藤、勾临链(广东海南)

Ichnocarpus frutescens (L.) W. T. Aiton in Hort. Kew. ed. 2, 2: 69. 1811; 中国高等植物图鉴, 3: 456, 图 4865. 1974; 海南植物志, 3: 245, 图 693. 1974.——*Apocynum frutescens* Linn. Sp. Pl. 213. 1753.——*Gardenia volubilis* Lour. Fl. Cochinch. 148. 1790.——*Echites frutescens* Wall. Cat. 1674. 1829, nom., Roxb. Fl. Ind. 2: 13. 1824, descr.——*Ichnocarpus ovatifolius* A. DC. Prodr. 8: 435. 1844.——*Ichnocarpus volubilis* Merr. in Philip. Journ. Sci. 21: 506. 1922.——*Microchites sinensis* Markgr. in Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin-Dahlem 11: 215. 1931.

1a. 腰骨藤(原变型) 图版 79

* 腰骨藤属(中国植物科属检索表)。