

Ichnocarpus frutescens* (L.) W. T. Aiton f. *frutescens

木质藤本, 长达 8 米、小枝、叶背、叶柄及总花梗无毛, 仅幼枝上有短柔毛, 具乳汁。叶卵圆形或椭圆形, 长 5—10 厘米, 宽 3—4 厘米; 侧脉每边 5—7 条。花白色, 花序长 3—8 厘米; 花萼内面腺体有或无; 花冠筒喉部被柔毛; 花药箭头状; 花盘 5 深裂, 裂片线形, 比子房为长; 子房被毛。蓇葖双生, 叉开, 一长一短, 细圆筒状, 长 8—15 厘米, 直径 4—5 毫米, 被短柔毛; 种子线形, 顶端具种毛。花期 5—8 月, 果期 8—12 月。

分布于云南、广西、广东、福建等省区。生于海拔 150—950 米山地疏林中, 常生于低丘陵山坡灌木丛中或路旁。斯里兰卡、印度、马来西亚、菲律宾及大洋洲也有分布。模式标本采自斯里兰卡。

茎皮纤维坚韧, 可编绳索; 种子浸酒可治腰骨风湿痛。

我国许多文献书籍及标本室定名和国外许多著作均把本种命名为 *Ichnocarpus frutescens* (L.) R. Br.。经考证, R. Brown 没有作过正式组合, 所以国际植物命名法规属的保留名单中 (Int. Cod. Bot. Nom. 351. 1972.) 规定属的模式种为: *Ichnocarpus frutescens* (L.) W. T. Aiton.。因此澄清如上。

1b. 毛叶腰骨藤 (新拟)

***Ichnocarpus frutescens* (L.) W. T. Aiton f. *pubescens* Markgr. in Engl. Bot. Jahrb. 61: 208. 1927; Tsiang in Sunyatsenia 3: 156. 1936.**

本变型与原变型之不同在于: 枝条和叶背密被短柔毛。

产于贵州。生于山地林中。印度也有分布。

2. 少花腰骨藤 (海南植物志) 红杜仲 (广西) 图版 80

***Ichnocarpus oliganthus* Tsiang, in Sunyatsenia 3: 156, Pl. 17. 1936; 中国高等植物图鉴, 3: 456, 图 4866. 1974; 海南植物志, 3: 246. 1974. ——*Ichnocarpus fulvus* Kerr in Kew Bull. 1937: 91. 1937.**

木质藤本, 长达 10 米; 小枝、叶背、叶柄、总花梗、花萼片外面及蓇葖均被锈色绒毛, 具乳汁。叶近革质, 长椭圆形, 长 4—7.5 厘米, 宽 1.5—3.2 厘米; 侧脉每边 7—9 条。聚伞花序腋生, 比叶为短, 长 1.5 厘米, 着花 2—9 朵; 花梗上有众多小苞片, 小苞片卵圆形, 长 2 毫米, 被绒毛; 花萼内面腺体约 20 个; 花冠红色, 高脚碟状, 长 4 毫米, 直径 6.5 毫米, 外面无毛, 内面花冠喉部及雄蕊背后的花冠筒壁上被长柔毛, 花冠筒圆筒状, 中部膨大, 长 3 毫米, 直径 1.5 毫米, 花冠裂片长圆状镰刀形, 长 3 毫米, 基部宽 1.2 毫米, 向右覆盖, 无毛; 雄蕊着生在花冠筒近基部, 花药箭头状, 长 2 毫米; 花盘 5 浅裂, 其顶端比子房短; 子房被毛, 由 2 枚离生心皮组成。蓇葖双生, 长圆形, 长



图版 80 少花腰骨藤 *Ichnocarpus oliganthus* Tsiang. 1.花枝; 2.花和小苞片; 3.花萼展开; 4.花冠展开; 5.蓇葖; 6.种子。(吴翠云仿绘)

12—18 厘米,直径 5 毫米;种子线形,顶端具黄色种毛,种毛长 3 厘米。花期 8 月,果期 8—10 月。

产于广东和广西。生于海拔 300—500 米山地疏林中。泰国也有。模式标本采自广东保亭。

树皮药用,有宽筋活血之效。

41. 乐东藤属*——*Chunechites* Tsiang

Tsiang in Sunyatsenia 3: 305. 1937.

藤状灌木,有乳汁;叶柄间及叶腋内具少数腺体。叶对生,窄披针形,具柄,具纤细疏离的侧脉。聚伞花序圆锥状,生于顶枝的叶腋中;花萼小,5 深裂,裂片双盖覆瓦状排列,内面基部具 5 枚腺体,萼片长圆状披针形;花冠近坛状或近辐状,花冠喉部无鳞片,花冠裂片 5 枚,向右覆盖,线状长圆形,弯斜呈不等大镰刀形,外侧边缘中部具一锯齿;雄蕊 5 枚,着生在花冠筒基部,花丝短,花药箭头状披针形,顶头渐尖,基部具耳,腹部与柱头粘生;花盘环状,不明显 5 裂;子房由 2 枚离生心皮组成,比花盘长,顶端被长柔毛;每心皮有胚珠 8—10 颗,4 排;花柱极短,柱头长圆棒状或陀螺状,顶端具尖头,近全缘或短 2 裂。蓇葖双生,略叉开,线状披针形;种子长圆状披针形,顶端具黄色绢质种毛。

1 种,我国特产,分布于浙江和广东(海南)。

本属模式种为: *Chunechites xylinabariopsoides* Tsiang

乐东藤(海南植物志) 图版 81

Chunechites xylinabariopsoides Tsiang in Sunyatsenia 3: 306, Pl. 36. 1937; 中国高等植物图鉴, 3: 457, 图 4867. 1974; 海南植物志, 3: 236, 图 684. 1974. —*Xylinabariopsis ventii* T. D. Ly in Fedde, Rep. 86 (9—10): 500, Abb. 1. 1975.

藤状灌木,长约 1 米,有乳汁;茎皮枝条暗褐色,密被灰褐色短柔毛;枝条圆柱状,直径 1—2 毫米,节间长 2—9 厘米;叶柄间及叶腋内具小腺体,腺体黑褐色,钻状线形,长约 1 毫米。叶近革质,窄披针形,长 3—6 厘米,宽 1.0—1.7 厘米,顶端短渐尖,基部宽楔形;中脉和侧脉在叶面凹入,在叶背略凸起,侧脉每边 5—7 条,明显;叶柄长 2—3 毫米,被灰褐色短柔毛。聚伞花序圆锥状、三歧,腋生,着花约 6 朵,比叶为长,长 5—8 厘米,直径 6 厘米;总花梗被灰褐色短柔毛;小苞片线状披针形,长 3—4 毫米,

* 乐东藤属(海南植物志)。