

明显2裂。蓇葖双生或1个不发育,卵圆状披针形,基部胀大,长6—7厘米,基部直径1.5—2厘米,外果皮基部多皱纹,中部以上有细条纹;种子线状长圆形,暗黄色,有柔毛,基部锐尖,顶端近截形,长10—15毫米,宽2—3毫米;种毛白色绢质,轮生,长约3厘米;胚长圆形,子叶与幼根几等长,子叶白色,倒披针形,两端钝头,长7毫米,宽2毫米;幼根圆柱状,长6毫米。花期4—6月,果期7月—翌年6月。

产于广西、广东、湖南和贵州等省区。生于海拔200—1000米的山地疏林中或山谷阴湿地方,攀援于树木之上。模式标本采自广西上思。

全株供药用,有镇静、镇痛、降低血压作用,广西民间用来治刀伤痛、眼痛、脚痛和驳骨等。

5. 大赛格多(云南) 赫马结(云南)

Parabarium tournieri Pierre in Spire, Contrib. à l'Étude des Apocyn. 13. 1905; Pitard in Lec. et Humb. Fl. Gén. Indo-Chine 3: 1216. 1933; 中国高等植物图鉴, 3: 460, 图 4874. 1974. — *Ecdysanthera tournieri* Pierre, Rev. Cult. Colon. 11: 228. 1902, nomen.

粗壮高大藤本,长达20米;小枝及花序具微柔毛,含白色乳汁;茎皮棕褐色,有明显的皮孔。叶长圆形或狭长圆形,先端具骤尖头,长11—17.5厘米,宽2.5—6厘米;侧脉每边7—9条。聚伞花序腋生,伞房状,长8—16厘米;花白色,花冠裂片不对称,在花蕾中内褶。蓇葖粗壮,近木质,长圆状宽披针形,端略内弯,长达10厘米,直径2厘米,外果皮具皱纹及浅沟,有皮孔;种子长圆形,长1.5厘米,直径约3毫米;种毛淡黄色,长约3厘米。花期11月—翌年9月,果期8—11月。

产于云南南部。生于海拔780—1750米的常绿阔叶林中,土壤肥沃湿润地方。老挝也有。模式标本采自老挝。

本植物胶乳总固形物含胶量87.75%。

6. 牛角藤(云南) 养当杜(云南少数民族名);杜仲藤(云南)

Parabarium linearicarpum (Pierre) Pichon in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris Sér. 2, 20: 302. 1948. — *Ecdysanthera linearicarpa* Pierre, Rev. Cult. Colon. 11: 228. 1902. — *Parabarium linocarpum* Pierre in Spire, Contr. à l'Étude des Apocyn. 36. 1905; Pitard in Lec. et Humb. Fl. Gén. Indo-Chine 3: 1215. 1933.

木质藤本,全株无毛,具白色乳汁;枝条具皮孔。叶薄革质,椭圆形至卵状披针形,长6—8厘米,宽3—3.5厘米,基部阔楔形至近圆形,顶端骤狭成长尾状渐尖;叶面绿色,叶背淡绿色;侧脉每边约4条;叶柄长6—10毫米。聚伞花序腋生;花小,淡