

黄色;花萼5深裂,内面基部具有小腺体;花冠近钟状,不对称,在花蕾内裂片内折,开花后裂片才伸直;雄蕊5枚,着生于花冠筒的基部,花丝短,花药基部具耳;花盘环状,比子房短;子房由2枚离生心皮所组成,被柔毛,花柱短,柱头卵球状,顶端微2裂。蓇葖2个叉开,线形,长约13—14厘米,直径约5—10毫米;种子长圆形,淡褐色,顶端具白色绢质种毛。花期8—12月,果期10月—翌年4月。

产于云南。生于海拔500—1300米热带雨林中、疏林中的润湿地方。老挝也有。模式标本采自老挝。

茎皮胶乳中含有橡胶,可割取加工为各种橡胶制品。胶乳总固形物含胶量达90.9%。

7. 中赛格多(云南) 杜浓(云南)

Parabarium spireanum Pierre in Spire, Caout. Indo-Chine 22. 1906; Pitard in Lec. et Humb. Fl. Gén. Indo-Chine 3: 1220. 1933.

木质藤本,长达35米,全株含白色乳汁;茎皮棕褐色,密被圆形白色皮孔;小枝绿色细长,柔软。叶薄革质,卵状披针形至卵状椭圆形,长6—13厘米,宽3—5.5厘米,顶端短渐尖,基部阔楔形,叶面亮绿色,叶背淡绿色,两面无毛;叶柄长1—3厘米。聚伞花序顶生;总花梗细长,长达12厘米,无毛;花小,白色;花萼杯状,顶端5裂,内面基部具有5个小腺体;花冠近钟状,裂片5枚,在花蕾时内褶,开花后伸直;雄蕊5枚,着生于花冠筒的基部,花丝短,花药箭头状,基部具耳;花盘环状,比子房短;子房由2枚离生心皮所组成,顶端具长柔毛,花柱短,柱头顶端微2裂。蓇葖双生,线形,长10—17厘米,直径8—10毫米;种子长圆形,扁平,顶端具白色绢质种毛。花期8—11月,果期11月—翌年1月。

产于云南南部和广西。生于海拔500—1300米山地常绿阔叶林中,土壤肥沃润湿地方。越南、老挝也有分布。模式标本采自越南。

茎皮胶乳中含橡胶,品质优良,富有弹性,可提制各种橡胶制品。

12. 思茅藤族——Trib. Epigyneae

Tsiang et P. T. Li, trib. nov.*

子房半下位;花冠裂片向左或向右覆盖。

本族我国产2种。

* Trib. Epigyneae Tsiang et P. T. Li, trib. nov. Ovarium semi-inferius, corollae lobis sinistrorsum vel dextrorsum obtegentibus. Typus generis: Epigynum Wight.