

45. 富宁藤属*——*Parepigynum* Tsiang et P. T. Li

Tsiang et P. T. Li in Acta Phytotax. Sinica 11: 394. 1973.

粗壮藤本,除花序及幼嫩部分外,全株无毛。叶对生,长圆状椭圆形;叶脉远距。聚伞花序伞房状,顶生或腋生;花萼5深裂,基部内面有5个钻状腺体;花冠浅高脚碟状,花冠筒圆筒状,内面在雄蕊背后的筒壁上具倒生刚毛,花冠裂片5枚向左覆盖;雄蕊5枚,着生于花冠筒的近基部,花药箭头状,基部具耳;花盘肉质,5深裂,裂片近四方形,将子房全部包围;子房半下位,由2个心皮组成,每心皮具多个胚珠。蓇葖2枚合生,成熟时上部裂开,狭披针形;具粗柄;种子线状长圆形,端具短阔之喙,沿喙围生黄白色种毛。

1种,分布于云南和贵州。

本属模式种为: *Parepigynum funingense* Tsiang et P. T. Li

富宁藤(植物分类学报) 图版 87

Parepigynum funingense Tsiang et P. T. Li in Acta Phytotax. Sinica 11: 395, Pl. 54. 1973; 中国高等植物图鉴, 3: 461, 图 4876. 1974.

粗壮高大藤本,除花序及幼嫩部分外,全株无毛。叶腋间及腋内均有钻状腺体,长约1毫米。叶对生,长圆状椭圆形至长圆形,端部短渐尖,基部楔形,长8—14厘米,宽2.5—4.5厘米;叶脉远距,每边10—13条。聚伞花序伞房状,顶生及腋生,着花6—13朵;花萼5深裂,裂片双盖覆瓦状排列,长圆状披针形,长7毫米,宽2毫米,两面均被柔毛,花萼基部内面有5个钻状腺体;花冠黄色,浅高脚碟状,花冠筒长1.2厘米,内面在雄蕊背后的筒壁上具倒生刚毛,裂片向左覆盖,椭圆形,端部钝,长1.1厘米,宽0.8厘米;雄蕊着生于花冠筒的近基部,花药箭头状,基部有耳;花盘肉质,将子房全部包围,5深裂,裂片近四方形;子房半下位,由2个心皮组成,每心皮具多数胚珠,端部具长硬毛,花柱丝状,长3.5毫米,柱头头状,长1.5毫米,端部锐尖。蓇葖2枚合生,成熟时上部裂开,狭披针形,向端部渐尖,外果皮绿色,干时暗褐色,有纵条纹,长14—18厘米,直径1.5厘米;果柄粗壮,长2—3厘米;种子棕褐色,线状长圆形,长2—3厘米,直径2—6毫米,端部具短阔之喙,沿喙围生黄白色种毛;种毛长约2厘米。花期2—9月,果期8月—翌年3月。

产于云南富宁、马关、西畴、麻栗坡和贵州等地。生于海拔1000—1600米山地

* 富宁藤属(植物分类学报)。

密林中。模式标本采自云南富宁。

46. 思茅藤属*——*Epigynum* Wight

Wight, Ic. t. 1308. 1848.

攀援灌木,具乳汁。叶对生;侧脉远离。花多朵组成近伞房状或近圆锥状的聚伞花序;花萼5裂,裂片披针形,内面基部无腺体或稀有腺体(中国种);花冠高脚碟状,花冠筒伸长,在雄蕊着生处膨大,花冠喉部具长柔毛;花冠裂片5枚,在花蕾中及花开时其基部向右覆盖;雄蕊5枚,离生,着生在花冠筒中部之下而隐藏于其中,花丝甚短,花药狭箭头状,顶端渐尖,基部具耳,腹部粘生在柱头上;子房半下位,由2枚离生心皮组成,花柱丝状,柱头长圆锥状;花盘裂片5枚,围绕子房;胚珠在每室内多数;蓇葖双生,圆柱状;种子长圆形或线状长圆形,扁平,顶端具种毛。

约14种,分布我国、缅甸和马来西亚。我国产1种,产于云南南部。

本属模式种为: *Epigynum griffithianum* Wight

思茅藤(植物分类学报) 图版88

Epigynum auritum (Schneid.) Tsiang et P. T. Li in Acta Phytotax. Sinica **11**: 397. 1973; 中国高等植物图鉴, **3**: 462, 图4877. 1974. — *Trachelospermum auritum* Schneid. in Sargent, Pl. Wils. **3**: 341. 1916. — *Epigynum lachnocarpum* Pichon in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, Ser. 2, **20**: 192. 1948.

攀援灌木,其幼嫩部分具黄色密柔毛,老渐无毛。叶纸质,椭圆形至椭圆状倒卵形,顶端短渐尖,基部略具心形,长8—15厘米,宽4.5—11.5厘米,两面均被黄色长柔毛,在叶脉上更密;叶柄长5—10毫米,密被黄色长柔毛。花多朵,组成顶生、约与叶等长而密被黄色柔毛的圆锥状聚伞花序;花梗长5—10毫米;苞片线形,长2—5毫米;花萼裂片线状披针形,锐尖至渐尖,长4—5毫米,端部略为张开,内面基部有腺体;花冠白色,花冠筒窄圆筒状,伸长,长1.5—1.7厘米,基部直径约1厘米,喉部被长柔毛,花冠裂片斜倒卵形,短渐尖,长1.2—1.3厘米,展开;花药长约4毫米,无毛;子

* 思茅藤属(植物分类学报)。

图版87 富宁藤 *Parepigynum funingense* Tsiang et P. T. Li, 1.花枝; 2.花; 3.花萼展开,示腺体; 4.花冠展开,示雄蕊着生; 5.花冠一部分展开,示雄蕊背后着生刚毛; 6.雄蕊腹面观; 7.雄蕊背面观; 8.雌蕊及花盘; 9.花托,示子房着生; 10.子房纵切面; 11.蓇葖; 12.种子。(杨可四仿绘)

