

45. 富宁藤属*——*Parepigynum* Tsiang et P. T. Li

Tsiang et P. T. Li in Acta Phytotax. Sinica 11: 394. 1973.

粗壮藤本,除花序及幼嫩部分外,全株无毛。叶对生,长圆状椭圆形;叶脉远距。聚伞花序伞房状,顶生或腋生;花萼5深裂,基部内面有5个钻状腺体;花冠浅高脚碟状,花冠筒圆筒状,内面在雄蕊背后的筒壁上具倒生刚毛,花冠裂片5枚向左覆盖;雄蕊5枚,着生于花冠筒的近基部,花药箭头状,基部具耳;花盘肉质,5深裂,裂片近四方形,将子房全部包围;子房半下位,由2个心皮组成,每心皮具多个胚珠。蓇葖2枚合生,成熟时上部裂开,狭披针形;具粗柄;种子线状长圆形,端具短阔之喙,沿喙围生黄白色种毛。

1种,分布于云南和贵州。

本属模式种为: *Parepigynum funingense* Tsiang et P. T. Li

富宁藤(植物分类学报) 图版 87

Parepigynum funingense Tsiang et P. T. Li in Acta Phytotax. Sinica 11: 395, Pl. 54. 1973; 中国高等植物图鉴, 3: 461, 图 4876. 1974.

粗壮高大藤本,除花序及幼嫩部分外,全株无毛。叶腋间及腋内均有钻状腺体,长约1毫米。叶对生,长圆状椭圆形至长圆形,端部短渐尖,基部楔形,长8—14厘米,宽2.5—4.5厘米;叶脉远距,每边10—13条。聚伞花序伞房状,顶生及腋生,着花6—13朵;花萼5深裂,裂片双盖覆瓦状排列,长圆状披针形,长7毫米,宽2毫米,两面均被柔毛,花萼基部内面有5个钻状腺体;花冠黄色,浅高脚碟状,花冠筒长1.2厘米,内面在雄蕊背后的筒壁上具倒生刚毛,裂片向左覆盖,椭圆形,端部钝,长1.1厘米,宽0.8厘米;雄蕊着生于花冠筒的近基部,花药箭头状,基部有耳;花盘肉质,将子房全部包围,5深裂,裂片近四方形;子房半下位,由2个心皮组成,每心皮具多数胚珠,端部具长硬毛,花柱丝状,长3.5毫米,柱头头状,长1.5毫米,端部锐尖。蓇葖2枚合生,成熟时上部裂开,狭披针形,向端部渐尖,外果皮绿色,干时暗褐色,有纵条纹,长14—18厘米,直径1.5厘米;果柄粗壮,长2—3厘米;种子棕褐色,线状长圆形,长2—3厘米,直径2—6毫米,端部具短阔之喙,沿喙围生黄白色种毛;种毛长约2厘米。花期2—9月,果期8月—翌年3月。

产于云南富宁、马关、西畴、麻栗坡和贵州等地。生于海拔1000—1600米山地

* 富宁藤属(植物分类学报)。