

- 10. 西藏弓果藤 *T. himalensis* Falc. ex Hook. f
 10. 叶椭圆状长圆形, 叶背密被锈色长柔毛; 侧脉 6—8 对.....
 11. 毛弓果藤 *T. villosus* (Bl.) Decne.
 11. 柱头伸出花冠喉部之外。
 12. 柱头被微毛
 11a. 毛弓果藤(原变种) *T. villosus* (Bl.) Decne. var. *villosus*
 12. 柱头无毛 ... 11b. 小叶弓果藤 *T. villosus* (Bl.) Decne. var. *thorelii* Cost.
 11. 柱头不伸出花冠喉部之外, 仅达花冠筒一半
 11c. 短柱弓果藤 *T. villosus* (Bl.) Decne. var. *brevistylis* Cost.

组 1. 弓果藤组 Sect. *Toxocarpus*——Sect. *Schistocodon* (Schauer) Tsiang in Sunyatsenia 4: 66. 1939.——*Schistocodon* Schauer in Nova Acta Acad. Nat. Cur. 19: Suppl. 1: 362. 1843 (gen.).

花冠辐状; 副花冠深 5 裂; 花柱厚纺锤状或圆柱状。

1. 圆叶弓果藤(海南植物志)

Toxocarpus ovalifolius Tsiang in Sunyatsenia 2: 193, Pl. 193. 1934, op. cit. 4: 68. 1939; Merr. in Journ. Arn. Arb. 23: 192. 1942; 海南植物志, 3: 257, 图 705. 1974.

攀援灌木; 嫩枝被锈色柔毛, 老时毛渐脱落, 棕褐色, 有皮孔。叶薄革质, 宽椭圆形或卵圆状圆形, 长 3.5—6 厘米, 宽 2.7—4.5 厘米, 顶端圆形, 具短尖头, 稍微凹而具骤尖, 基部圆形或近截形或浅心形, 边缘略为外卷; 侧脉 6 对, 上面略为凹陷, 下面隆起, 在边缘前网结; 叶柄长 1.5 厘米, 上面具凹槽。伞形状聚伞花序腋生; 花序梗长 6 毫米, 被锈色柔毛, 两歧, 着花达 10 朵; 花梗长 3 毫米, 具疏柔毛; 花萼深 5 裂, 双盖覆瓦状排列, 外面被长柔毛, 内部有腺体, 裂片膜质, 长短不等, 卵圆状长圆形, 长 2.5 毫米, 宽 1.5 毫米; 花冠近辐状, 无毛, 花冠筒长 2 毫米, 直径 3 毫米, 裂片略为向左覆盖, 深裂, 线状长圆形, 长 8 毫米, 宽 2 毫米; 副花冠 5 裂, 贴生在雄蕊背面, 厚而扁平, 长 2 毫米; 花药小, 舌状; 花粉块每室 2 个; 心皮 2, 花柱圆柱状, 伸出于雄蕊之外。蓇葖圆柱状, 成熟后又开而成 200° 角, 长约 8 厘米, 中间直径 1 厘米, 外果皮被黄色绒毛, 向顶部渐狭; 种子扁平, 卵圆状长圆形, 长宽约 3 毫米, 无毛, 有明显的边缘; 种毛白色, 长约 4 厘米。花期 8—9 月, 果期 10—12 月。

产于广东(海南)。生长于海拔 100 米的旷野灌木丛中。分布于越南。模式标本采自广东崖县。

2. 弓果藤(广州植物志) 图版 97