

本变种与原变种不同之处：叶较小，卵圆形，长 4.5—5.5 厘米，宽 2.8—3.2 厘米，顶端具短尖。蓇葖较狭而伸长，长 15—18 厘米，直径 5 毫米。花期 5 月，果期 12 月。

产于云南和广西等省区。生长于海拔 1500 米的密林中。分布于越南、老挝、柬埔寨。模式标本采自越南。

11c. 短柱弓果藤(新拟)

Toxocarpus villosus (Bl.) Decne. var. **brevistylis** Cost. in Lec. et Humb. Fl. Gén. Indo-Chine 4: 52. 1912; Tsiang in Sunyatsenia 4: 83. 1939.

本变种与原变种不同之处：叶卵圆形，长 4.5—7 厘米，宽 3.2—5.6 厘米；柱头极短。花期 5 月。

产于福建。分布于越南、老挝、柬埔寨。模式标本采自越南、老挝、柬埔寨。

8. 勐腊藤属*——**Goniostemma** Wight

Wight, Contrib. Bot. Ind. 62. 1834.

藤状灌木。叶对生，具柄，羽状脉。聚伞花序圆锥状，腋生或腋外生，比叶为长，着花多朵；花萼 5 裂，裂片双盖覆瓦状排列，花萼内面基部具有 5 个小腺体，腺体顶端有 2 个小齿；花冠辐状，深 5 裂，裂片向左覆盖，花冠筒短，内面有 5 枚与花冠裂片对生的鳞片，或缺；副花冠着生于合蕊冠上，筒状，肉质，顶端短 5 裂，裂片顶端圆、外反，与雄蕊等长；雄蕊 5，腹部与雌蕊粘生，花丝合生成短筒，花药顶端无膜片；花粉块在每个药室内藏 2 个，长圆形，直立，相邻两药室的 4 个花粉块连结在微小的着粉腺上，花粉块柄极短或无；子房由 2 枚离生心皮所组成，柱头纺锤形，顶端短 2 裂。

2 种，分布于我国和印度。我国产 1 种，产于云南。

本属模式种为：*Goniostemma acuminatum* Wight

勐腊藤(植物分类学报) 图版 100

Goniostemma punctatum Tsiang et P. T. Li in Acta Phytotax. Sinica 12: 81, Pl. 13. 1974.

藤状灌木；枝与小枝具有微毛，老时毛渐脱落；茎皮有明显的小疣体。叶薄纸质，椭圆形或椭圆状长圆形，长 6—9 厘米，宽 2.5—4 厘米，顶端锐尖，基部近圆形，叶面干时有光泽，叶背略淡，两面无毛，有透明腺点；中脉在叶面扁平，在叶背略为隆起，侧

* 勐腊藤属(植物分类学报)。