

脉每边有 12—15 条,弧形上升;叶柄长约 2 厘米,无毛,顶端丛生有 8—10 个小腺体,腺体锥尖状而黑色。两歧圆锥状聚伞花序腋间着生,比叶为长,着花多朵,平展;花序梗具锈色柔毛,长达 10 厘米;花萼裂片卵圆形,长和宽约 1.5 毫米,花萼内面基部有 5 个小腺体,腺体顶端有 2 个小锯齿;花冠黄色,辐状,深 5 裂,裂片长圆形,长 5 毫米,宽 2 毫米,外面无毛,内面密被硬毛,在花蕾时向左覆盖,花冠筒短,内面无鳞片;副花冠筒状,着生于合蕊冠上,肉质,顶端短 5 裂,裂片外反,裂片顶端圆,与雄蕊等长;花药顶端无膜片;花粉块 4 个连结在 1 个着粉腺上,长圆形,直立,无花粉块柄,着粉腺微小,全缘;子房无毛,心皮离生,每心皮有胚珠多个,柱头纺锤形。花期 10 月。

产于云南南部。生长于海拔 200 米山地林中。模式标本采自云南勐腊。

4、鲫鱼藤族——Trib. Secamoneae R. Br.

R. Br. in Mem. Wern. Soc. 1: 55. 1810.

本族主要特征为花药顶端具有膜质附属体。

本族我国产 2 属。

9. 须花藤属*——*Genianthus* Hook. f.

Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 15. 1883.

攀援木质藤本。叶对生,全缘,具柄,羽状脉。聚伞花序腋生,单生或分枝成两歧状;花萼 5 深裂,裂片内面基部有腺体;花冠辐状,裂片 5 枚,镊合状排列,内面被长柔毛;副花冠 5 裂,贴生于合蕊冠上;花粉块每室 2 个,直立;子房由 2 枚离生心皮组成,柱头膨大成棍棒状或纺锤状。蓇葖双生,圆筒状,向端部渐狭;种子长圆形,顶端具白色绢质种毛。

约 10 种,分布于亚洲热带和亚热带地区。我国产 1 种,产于云南。

本属模式种为: *Genianthus laurifolius* (Roxb.) Hook. f.

须花藤(中国高等植物图鉴) 图版 101

Genianthus laurifolius (Roxb.) Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 16. 1883; Cost. in Lec. et Humb. Fl. Gén. Indo-Chine 4: 45. 1912; Tsiang in Sunyatsenia 4: 62, fig. 17. 1939; 中国高等植物图鉴, 3: 467, 图 4887. 1974. — *Asclepias laurifolius* Roxb. Fl. Ind. 2: 49, fig. 6 (18-22). 1832.

* 须花藤属(中国高等植物图鉴),别名髯瓣花属(中国种子植物科属辞典)。