

木质藤本，具乳汁；茎具显著突起的皮孔，除花序外全株无毛。叶宽椭圆形，长6—10厘米，宽3—6厘米；侧脉每边8—10条；叶柄长1.2—3厘米，顶端上面具丛生小腺体。聚伞花序腋生，多数分枝成两歧状，着花多朵；总花梗被锈色绒毛；花萼外面被锈色疏柔毛，内面基部具腺体；花冠淡黄色，辐状，裂片长圆形，镊合状排列，内面被长柔；副花冠5裂，贴生于合蕊冠上，裂片三角状长圆形，顶端渐尖；花粉块每室2个，近圆球形，直立；柱头膨大成纺锤状。蓇葖双生，圆筒形，长约12厘米，直径1厘米，棕绿色，外果皮有明显的颗粒状突起；种子长圆形，长约1.5厘米，暗褐色，顶端具白色绢质种毛；种毛长约5厘米。花期1—5月，果期8月—翌年1月。

产于云南南部。生长于海拔500—1000米山地杂林中。分布于锡金、印度、泰国及越南、老挝、柬埔寨。模式标本采自锡金。

10. 鲫鱼藤属*——*Secamone* R. Br.

R. Br. in Mem. Wern. Soc. 1: 55. 1810.

藤状灌木或半灌木，具乳汁。叶对生，纸质，通常有透明腺体，具叶柄，羽状脉。聚伞花序二至三歧，腋生；花序梗短或无；具有小苞片和苞片；花小；花萼5深裂；裂片双盖覆瓦状排列，内面基部通常无腺体或稀有小腺体；花冠近辐状，花冠筒短，裂片5，向右覆盖（中国种）；副花冠5裂，中部以下贴生于合蕊冠上，裂片小镰刀状或舌状，向外伸出；雄蕊5，着生于花冠筒基部，腹面与雌蕊粘生成合蕊柱，花丝合生成筒状（称合蕊冠），花药顶端具有透明膜片，覆盖于柱头；花粉块每花药4个，每室2个；子房由2枚离生心皮所组成，花柱短，柱头短圆锥体，有圆头的顶端；每心皮有胚珠多个，着生于腹面的胎座上。蓇葖叉生，披针状圆柱形；种子顶端具白色绢质种毛。

约100种，分布于非洲、亚洲热带、亚热带地区至大洋洲。我国产6种，分布于西南至华南地区。

本属模式种为：*Secamone emetica* (Retz.) R. Br.

分种检索表

- 1. 叶背被短柔毛。
 - 2. 叶有透明腺点…………… 1. 吊山桃 *S. sinica* Hand.-Mazz.
 - 2. 叶无透明腺点…………… 2. 锈毛鲫鱼藤 *S. ferruginea* Pierre ex Cost.
- 1. 叶两面均无毛。

* 鲫鱼藤属(海南植物志)，别名四粉块藤属(中国植物科属检索表)，式格藤属(中国种子植物科属辞典)。

3. 叶狭小, 宽 3 毫米以下, 通常线形或长圆状披针形, 无透明腺点 3. 丽江鲫鱼藤 *S. likiangensis* Tsiang
3. 叶较大, 宽 1—2.5 厘米, 椭圆形、椭圆状卵圆形, 有透明腺点。
4. 总花梗曲折; 叶顶端尾状渐尖 4. 鲫鱼藤 *S. lanceolata* Bl.
4. 总花梗不曲折; 叶顶端锐尖或急尖。
5. 叶顶端锐尖, 基部楔形; 老枝条无皮孔 5. 催吐鲫鱼藤 *S. szechuanensis* Tsiang et P. T. Li
5. 叶顶端急尖或钝, 基部宽楔形或浑圆; 老枝条具有皮孔 6. 斑叶鲫鱼藤 *S. bonii* Cost.

1. 吊山桃(广西) 细叶青藤(广西) 图版 102 (1—3)

Secamone sinica Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 997. 1936; Tsiang in Sunyatsenia 4: 55. 1939; 中国高等植物图鉴, 3: 467, 图 4888. 1974. — *Secamone esquirolii* Schltr. ex Lév. Fl. Kouy-Tchéou 44. 1914, nom. nud.

藤状灌木, 长达 8 米, 具有乳汁; 幼枝略被有锈色疏柔毛。叶纸质, 卵状披针形, 长 2—7 厘米, 宽约 2 厘米, 顶端渐尖, 基部近圆形或宽楔形, 具有透明腺点, 叶面无毛, 叶背被有短柔毛; 侧脉 6—10 条, 在叶面扁平, 在叶背略凸起, 斜曲上升, 至叶缘前网结; 叶柄长 2—5 毫米, 幼时被疏短柔毛, 老时毛渐脱落。聚伞花序腋生, 或近顶生, 具短的总花梗, 着花 2—6 朵, 密被锈色疏柔毛; 花梗长 5 毫米; 小苞片卵圆形, 长约 1 毫米, 急尖; 花萼裂片宽卵形, 长 1 毫米, 具细缘毛, 内面基部具有小腺体; 花冠黄色, 近辐状, 花冠筒短, 裂片长圆形, 长约 2 毫米, 向右覆盖, 内面有乳头突起; 副花冠裂片侧面扁平, 镰刀状, 比合蕊柱短; 花粉块 4 个, 系结于着粉腺上, 直立; 花药顶端具内弯的膜片; 子房无毛, 花柱短, 柱头短圆锥状; 胚珠每室多个。蓇葖纺锤状披针形, 长 4—6 厘米, 直径 7 毫米, 无毛; 种子褐色, 长圆形, 长 1.3 厘米, 宽 5 毫米, 基部浑圆, 两侧反卷, 顶端狭, 具白色绢质种毛; 种毛长 3.5 厘米。花期 5—6 月, 果期 9—10 月。

产于广东、广西、云南和贵州。生长于丘陵山地疏林中或溪旁密林荫处, 攀援于树上。模式标本采自贵州西南部。

叶可供药用, 壮筋骨, 补精催乳。

2. 锈毛鲫鱼藤(海南植物志)

Secamone ferruginea Pierre ex Cost. in Lec. et Humb. Fl. Gén. Indo-Chine 4: 44, fig. 6 (13-17). 1912; Tsiang in Sunyatsenia 4: 56. 1939; 海南植物志, 3: 257. 1974.

藤状灌木, 具乳汁; 小枝被有短柔毛, 老时被毛渐脱落。叶薄纸质, 卵状披针形, 长 4.5—6 厘米, 宽 1.2—2.5 厘米, 顶端渐尖, 基部钝, 边缘反卷, 叶面深绿色, 叶背被