

2. 浙江乳突果(中国高等植物图鉴)

Adelostemma microcentrum Tsiang in Sunyatsenia 2: 184, Pl. 34. 1934.

缠绕藤本,茎纤细,被疏短柔毛。叶薄纸质,窄椭圆状长圆形,或长圆状披针形,长3—7厘米,宽0.7—1.4厘米,顶端渐尖,基部楔形至钝,除叶面中脉被短柔毛外,叶两面均无毛;中脉在叶面扁平,在叶背凸起,侧脉每边5—7条,两面均扁平,不明显;叶柄长0.5厘米,被微毛,顶端具丛生小腺体。聚伞花序假伞形状,比叶为短,着花4—6朵;花梗基部有数枚小苞片;花萼裂片长圆形,外面被短柔毛,花萼内面基部有5个腺体;花冠黄色,近坛状,长6毫米,直径2.5毫米,两面无毛,花冠筒中部以下膨大,长4毫米,裂片长圆状披针形,长2毫米,宽0.5毫米;副花冠无;合蕊柱长2毫米;花药顶端具圆形膜质附属物;花粉块椭圆状长圆形,下垂;子房无毛,柱头盘状,顶端圆。蓇葖单生,长圆状披针形,长8.5—11厘米,直径5—7毫米,两端尖,基部有宿存的花萼裂片,无毛;种子长圆形,扁平,两侧内卷,长6毫米,宽1.5—2毫米,棕色,顶端具白色绢质种毛;种毛长2.5—3厘米。花期5—7月,果期7—10月。

产于浙江天目山、飞来峰、昌化等地。生长于山地林下岩石边。模式标本采自浙江天目山。

12. 尖槐藤属*——**Oxystelma** R. Br.

R. Br. in Mem. Wern. Soc. 1: 40. 1810.

藤状灌木或草本,具乳汁,全株无毛。叶窄,对生,具柄,羽状脉。花稍大,为疏散、总状花序式或伞形花序式的聚伞花序,或花单生,腋生,花序梗和花梗柔细;花蕾圆球状;花萼小,5裂,裂片双盖覆瓦状排列,花萼内面基部具有5个或更多的小腺体;花冠宽,骨盆状或坛状,短5裂,远比花冠筒短,向右覆盖;副花冠双轮,外轮副花冠着生于花冠基部,环状,边膜质,顶端截平,内轮副花冠着生于雄蕊的基部,5裂,裂片长三角形,背部肉质凸起,顶端长尖,高出柱头,基部心形或扩大;雄蕊5,着生于花冠基部,腹部与雌蕊粘生,花丝合生成短筒,花药顶端具有内弯的膜片;花粉块每室1个,长圆形,下垂;子房由2枚离生心皮组成,每心皮有胚珠多个,柱头膨大,基部具五稜,顶端凸起。蓇葖双生或因1个不发育而成单生,长圆形或卵状披针形,两侧具纵狭翅;种子小,顶端具白色绢质种毛。

约4种,分布于亚洲热带和亚热带地区。我国产1种,产于广东、广西和云南等

* 尖槐藤属(中国种子植物科属辞典),别名高冠藤属(中国植物科属检索表)。