

Pentascame brachyantha Hand.-Mazz. in Sitzgsanz. Ak. W. W. **61**: 168. 1924.——

Cynanchum stauntonii Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**: 996. 1936.

直立半灌木，高约1米，无毛，分枝或不分枝；须根纤细，节上丛生。叶对生，纸质，狭披针形，长6—13厘米，宽3—5毫米，两端渐尖；中脉在叶背显著，侧脉约6对；叶柄长约5毫米。伞形聚伞花序腋生；花序梗长达1厘米，小苞片众多；花萼5深裂，内面基部腺体不多；花冠紫红色，辐状，内面具长柔毛；副花冠裂片盾状，隆肿，比花药为短；花粉块每室1个，长圆形，下垂；柱头微凸，包在花药的薄膜内。蓇葖单生，长披针形，长达9厘米，直径6毫米。花期5—8月，果期9—10月。

产于甘肃、安徽、江苏、浙江、湖南、江西、福建、广东、广西和贵州等省区。生长于低海拔的山谷湿地、水旁以至半浸在水中。模式标本采自上海。

全株供药用，有清热解毒，降气下痰之效；民间用其根治肺病、小儿疳积、感冒咳嗽及慢性支气管炎等。

21. 水白前(植物分类学)

Cynanchum hydrophilum Tsiang et Zhang in Acta Phytotax. Sinica **12**: 94, Pl. 18. 1974.

直立草本，高30—45厘米；根丛生；茎单生，干后中空，除双列毛外，均被微毛；节间长2.5—6.5厘米。叶狭椭圆形，长6—9厘米，宽6—15毫米，两端渐尖，对生或在中部以下3叶轮生，在脉上被微毛；叶柄长5—7毫米，在顶端有少数小腺体或没有。花序各式：聚伞状、伞房状或伞形状；总花梗长2—15毫米，被微毛；花萼裂片三角形，渐尖，外面被疏柔毛，内面无毛，花萼内面基部有腺体5枚；花冠白色，辐状，直径8毫米，裂片卵圆形，钝头，长4毫米，宽2毫米，外面无毛，内面有微毛；副花冠比合蕊柱略短，5裂，裂片卵圆形；花粉块椭圆形，着粉腺短，花粉块柄短；柱头圆形，顶端平坦。花期6月。

产于四川。生长于海拔1150米高洼地浅水中。模式标本采自四川屏山。

22. 狭叶白前(中国高等植物图鉴)

Cynanchum stenophyllum Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **20**: 108. 1889.——
Vincetoxicum stenophyllum O. Kuntze, Rev. Gen. Pars **1**: 424. 1891.

直立草本，高30—40厘米；茎具单列毛；根丛生，直径约1.5毫米。叶对生，无毛，线状披针形，长达6厘米，宽5毫米；叶柄长2毫米。聚伞花序腋生，伞房状，长2—2.5厘米，着花10余朵；花萼裂片5枚，卵圆形，长1.3毫米，宽0.7毫米；花冠筒内面被茸毛，裂片卵圆形，钝头；副花冠5裂，裂片顶端圆形；花粉块每室1个，下垂；柱