

变种和变型;另一种是下述变种。

42b. 雀瓢(西北)

Cynanchum thesioides (Freyn) K. Schum. var. **australe** (Maxim.) Tsiang et P. T. Li in Acta Phytotax. Sinica **12**: 101. 1974.——*Vincetoxicum sibiricum* Decne. var. *australe* Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. **23**: 355. 1877.——*Cynanchum sibiricum* R. Br. var. *australe* Maxim. ex Komar. in Act. Hort. Petrop. **25**: 292. 1905; Noda, Fl. N.-E. Prov. China 1036. 1971.——*Cynanchum sibiricum* (L.) R. Br. var. *latifolium* Kitagawa, Rep. Ist. Sci. Exp. Manch. sect. 4, **4**: 90. 1936.

茎柔弱,分枝较少,茎端通常伸长而缠绕。叶线形或线状长圆形;花较小、较多。花期3—8月。

产于辽宁、内蒙古、河北、河南、山东、陕西、江苏等省区。生长于水沟旁及河岸边或山坡、路旁的灌木丛草地上。模式标本采自内蒙古鄂尔多斯。

用途与原变种相同。

组 6. 隔山消组 Sect. *Seutera* (Reichb.) Tsiang et Zhang, stat. nov.——*Seutera* Reichb. Consp. 131. 1828; Decne. in DC. Prodr. **8**: 590. 1844.——*Lyonia* Ell. Sketch S. Carol. et Goerg. **1**: 316. 1817, non Rafin. in Mitch. et al. Med. Repos. **5**: 352. 1808, nec Nutt. Gen. Am. **1**: 266. 1818.

副花冠裂片薄肉质,腹背两面皆扁平,内面不成龙骨状而成方形,其端部截形,基部略为紧缩;合蕊冠在近基部即合生,而在其湾缺处不成为5个兜状体。

本组我国产1种。

43. 隔山消(全国中草药汇编) 过山瓢、无梁藤、隔山撬(四川) 图版 134

Cynanchum wilfordii (Maxim.) Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 109. 1889 (“*C. wilfordi* Franch. et Sav.”); Kitagawa, Lin. Fl. Mansh. 364. 1939; 中国高等植物图鉴, **3**: 484, 图 4922. 1974.——*Cynoctonum wilfordi* Maxim. in Bull. Acad. St. Pétersb. **23**: 369. 1877.——*Vincetoxicum wilfordi* Franch. et Sav. Enum. Pl. Jap. **2**: 445. 1879.——*Seutera wilfordii* Pobed. in Komar. Fl. URSS. **18**: 713. 1952.

多年生草质藤本;肉质根近纺锤形,灰褐色,长约10厘米,直径2厘米;茎被单列毛。叶对生,薄纸质,卵形,长5—6厘米,宽2—4厘米,顶端短渐尖,基部耳状心形,两面被微柔毛,干时叶面经常呈黑褐色,叶背淡绿色;基脉3—4条,放射状;侧脉4