

毫米,上面有沟槽,顶端具丛生小腺体。聚伞花序伞形状,1—2 歧,腋外生,比叶为短,单生至 2—3 枝丛生,每花序着花 4—6 朵;花序梗长 4—7 毫米;花梗柔细,长 4—6 毫米,基部具有被微毛的苞片;花萼 5 深裂,裂片披针形,长 1 毫米,宽 0.5 毫米,外面被短柔毛,内面无毛,基部有 5 个腺体;花冠近钟状,外面无毛,内面被短柔毛,花冠筒长 2 毫米,裂片长圆形,与花冠筒等长,顶端钝;副花冠环状,着生于合蕊冠基部,顶端截平或略波状;花药顶端的圆形膜片内弯向柱头;花粉块每室 1 个,长圆形,下垂;子房由 2 枚离生心皮组成,无毛,柱头盘状五角形。蓇葖未见。 花期 6 月。

产四川宝兴县。生长于海拔 2720 米山地林中或河边杂木林中。模式标本采自宝兴。

5. 青龙藤(全国中草药汇编) 图版 147

Biondia henryi (Warb. ex Schltr. et Diels) Tsiang et P. T. Li in Acta Phytotax. Sinica 12: 114. 1974.——*Cynanchum henryi* Warb. ex Schltr. et Diels in Engl. Bot. Jahrb. 29: 542. 1900.


藤本;茎柔弱,直径约 2 毫米,无毛或幼枝上有微毛。叶薄纸质,窄披针形,长 3—4.5 厘米,宽 5—10 毫米,无毛;中脉在叶背凸起,侧脉不明显;叶柄约 3 毫米,被微毛,顶端具丛生小腺体。聚伞花序腋生,长 1—2 厘米;花序梗长 5—8 毫米,几无毛;花梗柔细;花萼 5 深裂,裂片披针形,外面被短柔毛,花萼内面基部有 5 个腺体;花冠近钟状,外面无毛,内面被疏微毛,裂片向外张开,卵状三角形,钝头,比花冠筒为长;副花冠 5 裂,着生于合蕊冠基部,裂片三角状,顶端钝;花药顶端圆形膜片内弯向柱头;花粉块长圆形,下垂,花粉块柄弯曲向上升;子房无毛,柱头盘状五角形。蓇葖单生,狭披针形,长 5—6 厘米,宽 3—4 毫米;种子顶端具白色绢质种毛。 花期 4—7 月,果期 7—10 月。

分布于四川、安徽、浙江和江西等省。生长于山地疏林中。模式标本采自四川南充。

6. 短叶秦岭藤(中国高等植物图鉴)

Biondia yunnanensis (Lév.) Tsiang in Sunyatsenia 6: 126, fig. 13. 1941.——*Dischidia yunnanensis* Lév. Cat. Pl. Yun.-Nan 14. 1915.——*Adelostemma mairei* Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 993. Abb. 30(8). 1936.

缠绕藤本,除花外全株无毛;茎灰色,有纵裂纹,直径 4 毫米;枝绿色,柔细,直径 1.5 毫米。叶膜质,狭长圆形至线状披针形,长 2—3.5 厘米,宽 3—7 毫米,两端钝头;中脉在叶面凹陷,在叶背略凸起,侧脉两面均扁平,不明显;叶柄 1—2 毫米,顶端具丛



图版 147 青龙藤 *Biondia henryi* (Warb. ex Schltr. et Diels) Tsiang et P. T. Li, 1.花枝; 2.花; 3.花萼; 4.合蕊柱和副花冠; 5.雄蕊腹面观; 6.雌蕊; 7.花粉器; 8.蓇葖; 9.种子。
(吴翠云绘)