

生腺体。聚伞花序近伞形状，腋外生，比叶为短，着花4—6朵；花序梗长4—10毫米，几无毛；花梗长3—5毫米，柔细无毛；花萼裂片卵状长圆形，外面和边缘被微毛，花萼内面基部有5个腺体；花冠淡黄色，坛状，花冠筒内面密被短柔毛，裂片长圆形，与花冠筒等长；副花冠着生于合蕊冠的基部，裂片齿状；花药顶端有圆形膜片；花粉块长圆形，下垂；子房无毛，柱头顶端凸起，基部五角形。蓇葖单生，披针形，长4—5.5厘米，直径6毫米，顶端渐尖，基部膨大，无毛；种子卵形，长7毫米，宽3毫米，有薄边缘，顶端具白色绢质种毛；种毛长1.3厘米。花期9月，果期10月。

产于云南和四川。生长于海拔2000米以上山地林中。模式标本采自云南。

22. 萝藦属*——*Metaplexis* R. Br.

R. Br. in Mem. Wern. Soc. 1: 48. 1810.——*Urostelma* Bunge,

Enum. Pl. China Bor. 44. 1831.——*Aphanostelma* Schltr. in Lév.

Fl. Kouy-Tchéou 40. 1914, non Malme in Arkiv. Bot. Stockh. 25

A, 9: 10. 1933.

多年生草质藤本或藤状半灌木，具乳汁。叶对生，卵状心形，具柄。聚伞花序总状式，腋生，具有长总花梗；花中等大或小；花萼5深裂，裂片双盖覆瓦状排列，花萼内面基部具有5个小腺体；花冠近辐状，花冠筒短，裂片5，向左覆盖；副花冠环状，着生于合蕊冠上，5短裂，裂片兜状；雄蕊5，着生于花冠基部，腹部与雌蕊粘生，花丝合生成短筒状，花药顶端具内弯的膜片；花粉块每室1个，下垂；子房由2枚离心皮组成，每心皮有胚珠多数，花柱短，柱头延伸成1长喙，顶端2裂。蓇葖叉生，纺锤形或长圆形，外果皮粗糙或平滑；种子顶端具白色绢质种毛。

约6种，分布于亚洲东部。我国产2种，分布于西南、西北、东北和东南部。

本属模式种为：*Metaplexis japonica* (Thunb.) Makino

分种检索表

1. 花蕾圆锥状，顶端尖；花冠内面被柔毛；蓇葖平滑无毛…1. 萝藦 *M. japonica* (Thunb.) Makino
1. 花蕾阔卵形，顶端钝或圆；花冠两面均无毛；蓇葖粗糙，被微毛…2. 华萝藦 *M. hemsleyana* Oliv.

1. 萝藦(唐本草) 芫兰(诗疏)；斫合子(本草纲目拾遗)；白环藤、羊婆奶、婆婆钹线包(河北)；羊角、天浆壳、蔓藤草、奶合藤、土古藤、浆罐头、奶浆藤(华北)；斑风藤

* 萝藦属(植物学名词审查本)。