

及蛇虫毒……”。也被吴其浚收载于《植物名实图考》。

2. **华萝藦**(中国高等植物图鉴) 萝藦藤(广西);奶浆藤(四川、贵州);奶浆草(四川);倒插花(贵州)图版 149

**Metaplexis hemsleyana** Oliv. in Hook. Ic. Pl **20**: Pl. 1970. 1891; Schltr. et Diels in Engl. Bot. Jahrb. **29**: 541. 1900; Schltr. op. cit. **36**: Beibl. 82, 92. 1905; 中国高等植物图鉴, **3**: 491, 图 4936. 1974.——*Holostemma sinense* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 103. 1889.——*Aphanostelma chinensis* Schltr. in Lév. Fl. Kouy Tchéou 40. 1914.——*Metaplexis sinensis* (Hemsl.) Hu in Journ. Arn. Arb. **6**: 143. 1925; Tsiang in Sunyatsenia **2**: 189. 1934, op. cit. **3**: 162. 1936, non *Metaplexis chinensis* Bunge, Enum. Pl. China Bor. 44. 1832 [= *Metaplexis japonica* (Thunb.) Makino].——*Metaplexis japonica* (Thunb.) Makino var. *platyloba* Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**: 994. 1936, syn. nov.


多年生草质藤本,长5米,具乳汁;枝条具单列短柔毛,节上更密,直径3毫米。叶膜质,卵状心形,长5—11厘米,宽2.5—10厘米,顶端急尖,基部心形,叶耳圆形,长1—3厘米,展开,两面无毛,或叶背中脉上被微毛,老时脱落,叶面深绿色,叶背粉绿色;侧脉每边约5条,斜曲上升,叶缘前网结;具长叶柄,长4.5—5厘米,顶端具丛生小腺体。总状式聚伞花序腋生,一至三歧,着花6—16朵;总花梗长4—6厘米,被疏柔毛;花梗长5—10毫米,被疏柔毛;花白色,芳香,长5毫米,直径9—12毫米;花蕾阔卵状,顶端钝或圆形;花萼裂片卵状披针形至长圆状披针形,急尖,与花冠等长;花冠近辐状,花冠筒短,裂片宽长圆形,长约5毫米,顶端钝形,两面无毛;副花冠环状,着生于合蕊冠基部,5深裂,裂片兜状;花药近方形,顶端具圆形膜片;花粉块长圆形,下垂,花粉块柄短,基部膨大,着粉腺卵珠状;心皮离生,胚珠每心皮多个;柱头延伸成1长喙,高出花药顶端膜片之上,顶端2裂。蓇葖叉生,长圆形,长7—8厘米,直径2厘米,外果皮粗糙被微毛;种子宽长圆形,长6毫米,宽4毫米,有膜质边缘,顶端具白色绢质种毛;种毛长3厘米。花期7—9月,果期9—12月。

分布于陕西、四川、云南、贵州、广西、湖北和江西等省区。生长于山地林谷、路旁或山脚湿润地灌木丛中。模式标本采自湖北宜昌。

全株供药用,有补肾强壮作用,可治肾亏遗精、乳汁不足、脱力劳伤等。

H. Handel-Mazzetti 的变种,其花冠裂片宽4毫米,无毛,经我们研究,即为本种无疑。

同属内不同种的种加词 *chinensis* 和 *sinensis*, 应视为“异种同名”处理,这是根据



图版 149 华萝藦 *Metaplexis hemsleyana* Oliv., 1.花枝; 2.花; 3.合蕊柱和副花冠; 4.花粉器; 5.蓇葖; 6.种子。(吴翠云绘)

《国际植物命名法规》(Int. Cod. Bot. Nomencl., Art. 75, 67. 1972.) 的规定,故本种学名改正如上。

### 23. 大花藤属\*——*Raphistemma* Wall.

Wall. Pl. Asiat. Rar. **2**: 50, t. 163. 1831.

藤状灌木,具乳汁,全株无毛。叶对生,膜质,心脏形,具长柄。聚伞花序伞形状,腋生,具长总花梗;花大,白色;花萼5裂,裂片双盖覆瓦状排列,花萼内面基部具5个腺体;花冠钟状,裂片5,右旋地覆盖;副花冠5片,膜质,着生于合蕊冠上,裂片长圆状披针形,下端长尖,高出合蕊柱,伸出花冠喉部之外;雄蕊5,着生花冠筒基部,腹部与雌蕊粘生成合蕊柱,花丝合生成短筒,花药顶端具有内弯的膜片;花粉块每室1个,下垂;子房由2枚离生心皮组成,每心皮有胚珠多个,花柱短,柱头膨大,顶端扁平。蓇葖纺锤形,下垂;种子卵圆形,顶端具有白色绢质种毛。

约2种,分布于我国、印度、锡金、缅甸、泰国和马来西亚等。我国产1种,产于云南。

本属模式种为: *Raphistemma pulchellum* (Roxb.) Wall.

**大花藤**(中国高等植物图鉴) 图版150

***Raphistemma pulchellum*** (Roxb.) Wall. Pl. Asiat. Rar. **2**: 50, t. 163. 1831; Wight, Contrib. Bot. Ind. 55. 1834; Decne. in DC. Prodr. **8**: 516. 1844; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **4**: 19. 1883; K. Schum. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenf. **4**, **2**: 244. 1895; Craib in Kew Bull. Misc. Inf. **1911**: 416. 1911; Cost. in Lec. et Humb. Fl. Gén. Indo-Chine **4**: 58. 1912; Ridl. Fl. Malay Penins. **2**: 380. 1923; Tsiang in Sunyatsenia **6**: 120. 1941; 中国高等植物图鉴, **3**: 492, 图 4937. 1974. ——*Asclepias pulchella* Roxb. Hort. Beng. 21. 1814, nom., Fl. Ind. **2**: 54. 1824, descr.

藤状灌木,具乳汁,全株无毛。叶膜质,心脏形,长8—15厘米,宽5—11厘米,顶端渐尖,叶面深绿色,叶背浅绿色;侧脉每边6—7条;叶柄长5—9厘米,顶端具有丛生小腺体。聚伞花序伞形状,腋生,着花4—12朵;花序梗长10—13厘米;花梗长3—4厘米;花蕾长圆形或长卵形,长1.5—2厘米,直径1—1.2厘米,顶端圆或钝;花较大,直径达3厘米,黄白色;花萼内面基部有5个腺体;花冠钟状,裂片长圆形,右旋地覆盖;副花冠裂片5,膜质,着生于合蕊冠上,裂片长圆状披针形,顶端长尖,高出合蕊

\* 大花藤属(中国植物科属检索表)。