

《国际植物命名法规》(Int. Cod. Bot. Nomencl., Art. 75, 67. 1972.) 的规定,故本种学名改正如上。

23. 大花藤属*——*Raphistemma* Wall.

Wall. Pl. Asiat. Rar. **2**: 50, t. 163. 1831.

藤状灌木,具乳汁,全株无毛。叶对生,膜质,心脏形,具长柄。聚伞花序伞形状,腋生,具长总花梗;花大,白色;花萼5裂,裂片双盖覆瓦状排列,花萼内面基部具5个腺体;花冠钟状,裂片5,右旋地覆盖;副花冠5片,膜质,着生于合蕊冠上,裂片长圆状披针形,下端长尖,高出合蕊柱,伸出花冠喉部之外;雄蕊5,着生花冠筒基部,腹部与雌蕊粘生成合蕊柱,花丝合生成短筒,花药顶端具有内弯的膜片;花粉块每室1个,下垂;子房由2枚离生心皮组成,每心皮有胚珠多个,花柱短,柱头膨大,顶端扁平。蓇葖纺锤形,下垂;种子卵圆形,顶端具有白色绢质种毛。

约2种,分布于我国、印度、锡金、缅甸、泰国和马来西亚等。我国产1种,产于云南。

本属模式种为: *Raphistemma pulchellum* (Roxb.) Wall.

大花藤(中国高等植物图鉴) 图版150

Raphistemma pulchellum (Roxb.) Wall. Pl. Asiat. Rar. **2**: 50, t. 163. 1831; Wight, Contrib. Bot. Ind. 55. 1834; Decne. in DC. Prodr. **8**: 516. 1844; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **4**: 19. 1883; K. Schum. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenf. **4**, **2**: 244. 1895; Craib in Kew Bull. Misc. Inf. **1911**: 416. 1911; Cost. in Lec. et Humb. Fl. Gén. Indo-Chine **4**: 58. 1912; Ridl. Fl. Malay Penins. **2**: 380. 1923; Tsiang in Sunyatsenia **6**: 120. 1941; 中国高等植物图鉴, **3**: 492, 图 4937. 1974. ——*Asclepias pulchella* Roxb. Hort. Beng. 21. 1814, nom., Fl. Ind. **2**: 54. 1824, descr.

藤状灌木,具乳汁,全株无毛。叶膜质,心脏形,长8—15厘米,宽5—11厘米,顶端渐尖,叶面深绿色,叶背浅绿色;侧脉每边6—7条;叶柄长5—9厘米,顶端具有丛生小腺体。聚伞花序伞形状,腋生,着花4—12朵;花序梗长10—13厘米;花梗长3—4厘米;花蕾长圆形或长卵形,长1.5—2厘米,直径1—1.2厘米,顶端圆或钝;花较大,直径达3厘米,黄白色;花萼内面基部有5个腺体;花冠钟状,裂片长圆形,右旋地覆盖;副花冠裂片5,膜质,着生于合蕊冠上,裂片长圆状披针形,顶端长尖,高出合蕊

* 大花藤属(中国植物科属检索表)。