

藤状灌木,具乳汁;茎被微毛。叶卵状心脏形,长5—7厘米,宽3.5—5厘米,两面均被微毛;叶柄长2—5厘米,顶端具有几个丛生小腺体。聚伞花序伞形状或不规则总状,腋生;花序梗长2.5—5厘米;花梗与花序梗等长;花萼裂片卵圆形,长1.5厘米,顶端钝,被缘毛;花冠辐状,开放后直径达2厘米,黄白色,内面带紫红色,裂片卵状长圆形,长1.5厘米,宽6毫米,顶端钝,向右覆盖;副花冠环状,10裂,肉质,着生于合蕊冠基部,比花药为短,长3毫米;花药较大,长圆形角状,发亮,粘合成1个有10个翅的柱,顶端小;花粉块伸长,镰刀形,长1毫米,下垂,花粉块柄柔弱,弯曲,着粉腺黑色;子房无毛,柱头内藏。蓇葖单生或双生,披针形,长10—13厘米,直径1厘米,无毛;种子卵圆形,扁平,长5毫米,边缘膜质呈翅状,顶端具白色绢质种毛;种毛长2—3厘米。花期4—9月,果期冬季。

产于云南、贵州、广东和广西等省区。生长于丘陵棘丛荒坡上。印度也有。模式标本采自印度。

全株可药用,治产后虚弱、催奶等。

25. 天星藤属*——*Graphistemma*

Champ. ex Benth. et Hook. f.

Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 2: 760. 1876.

木质藤本,具乳汁。叶对生,具叶柄,羽状脉,具托叶。单歧或二歧短总状式的聚伞花序,腋生;花萼5裂,裂片双盖覆瓦状排列,内面基部具腺体;花冠近辐状,花冠筒短,裂片5枚,比花冠筒长,向右覆盖;副花冠生于合蕊冠上,比花药短,环状5深裂,直立,裂片侧向外卷;雄蕊生于花冠基部,花丝合生成筒,花药顶端具膜片贴盖着柱头;子房由2枚离生心皮组成,花柱短,柱头五角状,顶端凸起;花粉块每室1个,下垂。蓇葖通常单生,披针状;种子有薄边,顶端具白色绢质种毛。

1种,分布于我国和越南。

本属模式种为: *Graphistemma pictum* (Champ.) Benth. et Hook. f. ex Maxim.

天星藤(广东) 大奶藤、鸡腿果、骨碗藤、牛奶藤、奶藤(广西); 罗摩藤(广东海南) 图版 152

Graphistemma pictum (Champ.) Benth. et Hook. f. ex Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. 23: 353. 1877; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 103.

* 天星藤属(中国植物科属检索表)。