

1889; Merr. in Lingnan Sci. Journ. **13**: 69. 1934; Tsiang in Sunyatsenia **2**: 191. 1934; 中国高等植物图鉴, **3**: 493, 图 4939. 1974; 海南植物志, **3**: 264, 图 712. 1974. —*Holostemma pictum* Champ. in Journ. Bot. Kew Misc. **5**: 53. 1853.

木质藤本,具乳汁,全株无毛。托叶叶状,抱茎,圆形或卵圆形,有明显的脉纹,长 1—3.5 厘米,宽 0.8—1.5 厘米。叶长圆形,长 6—20 厘米,宽 2.5—7 厘米,顶端渐尖或急尖,基部近心形或圆形,叶面深绿色,叶背浅绿色;侧脉每边约 10 条,扁平;叶柄扁平,长 1—4.5 厘米,顶端丛生小腺体。花序开始为伞形状聚伞花序,后伸长为单歧或二歧总状式聚伞花序,着花 3—12 朵;花序梗长 1.5—5 厘米;花梗长 0.5—1.5 厘米;花蕾卵珠状;花长 1.2 厘米,直径 2 厘米;花萼裂片卵圆形,长 4 毫米,宽 2 毫米,钝头,具缘毛,花萼内面基部有 5 个腺体;花冠外面绿色,内面紫红色,有黄色的边,花冠筒很短,裂片长圆形,长 8—10 毫米,宽 3—4 毫米,边缘具细缘毛;副花冠生于合蕊冠上,比花药为短,环状 5 裂,裂片侧向外卷;花药顶端有圆形膜片,贴盖着柱头;子房无毛,柱头五角状,顶端凸起。蓇葖通常单生,木质,披针状圆柱形,长 9—11 厘米,直径 3—4 厘米,上部渐狭,基部膨大;种子卵圆形,长 1.3 厘米,棕色,有膜质的边缘,顶端具白色绢质种毛;种毛长 4 厘米。花期 4—9 月,果期 7—12 月。

产于广东和广西。生长于丘陵山地疏林或山谷、溪边灌木丛中。分布于越南。模式标本采自广东南部岛屿。

全株可药用,华南地区民间用作驳骨、催乳、治喉痛、跌打。

6. 牛奶菜族——Trib. Marsdenieae Benth. et Hook. f.

Benth. et Hook. f. Gen. Pl. **2**: 769. 1876.

花粉块直立,上升或平展,但不下垂;花粉块柄亦与花粉块同一方向;着粉腺通常暗红而带棕色的。

本族我国产 17 属。

26. 石萝藦属*——*Pentasacme* Wall. ex Wight

Wall ex Wight, Contrib. Bot. Ind. 60. 1834.

多年生直立草本,通常不分枝,无毛。叶对生,狭披针形,具柄,羽状脉。伞形式聚伞花序腋生,花序梗极短;花萼 5 裂,裂片双盖覆瓦状排列,内面基部具有腺体;花

* 石萝藦属(中国种子植物科属辞典),别名凤尾草属(植物分类学报)。

冠近钟状或辐状，花冠筒短，裂片 5 枚，狭长，远较花冠筒长，向右覆盖；副花冠鳞片 5 枚，着生于花冠湾缺处，与花冠裂片互生，顶端具细齿；花药直立，顶端具膜片，内折覆盖着柱头的基部，花丝合生成短筒；花粉块每室 1 个，直立，顶端具透明的小尖头；子房由 2 枚离生心皮组成，花柱极短，柱头盘状五角形，顶端 2 裂。蓇葖双生，圆柱状披针形；种子顶端具白色绢质种毛。

8 种，分布于亚洲东部和东南部。我国产 1 种，分布于华南和西南部。

本属模式种为：*Pentasacme caudatum* Wall.

石萝藦 五来(植物学名词审查本)；水杨柳(广西)；南石萝藦(广西药用植物名录)；假了刁竹(广西)；凤尾草(广东)；满草(广东海南) 图版 153

Pentasacme championii Benth. in Journ. Bot. Kew Misc. **5**: 54. 1853, et Fl. Hongkong. 228. 1861; Tsiang in Sunyatsenia **2**: 199. 1934; 中国高等植物图鉴, **3**: 493, 图 4940. 1974; 海南植物志, **3**: 264, 图 713. 1974. ——*Pentasacme caudatum* sensu Merr. in Lingnan Sci. Journ. **5**: 152. 1927, non Wall.

多年生直立草本，高 30—80 厘米，通常不分枝，节间短，长 1.5—3 厘米，无毛。叶膜质，狭披针形，长 4—16 厘米，宽 0.5—1.5 厘米，顶端长尖，基部急尖；中脉两面凸起，侧脉不明显；叶柄极短，长 1—2 毫米。伞形状聚伞花序腋生，比叶为短，着花 4—8 朵；花序梗极短或近无梗；花梗纤细，长 3—6 毫米；花蕾急尖或渐尖，花长 1 厘米，直径 5 毫米；花萼裂片狭披针形，长约 1.5 毫米；花冠白色，裂片狭披针形，远比花冠筒长，长 6 毫米，基部略宽；副花冠成 5 鳞片，顶端具细齿，着生于花冠湾缺处，与花冠裂片互生；花药顶端膜片内折覆盖着柱头基部；花粉块卵圆形，直立，顶端具透明钩状的小尖头，中部与花粉块柄联结；子房无毛，柱头盘状五角形，顶端 2 裂。蓇葖双生，圆柱状披针形，长约 6 厘米，直径 3 毫米，无毛；种子小，顶端具白色绢质种毛；种毛长 1.5 厘米。花期 4—10 月，果期 7 月—翌年 4 月。

产于湖南、广东、广西和云南等省区。生长于丘陵山地疏林下或溪边、石缝、林谷中。分布于越南。模式标本采自我国广东南部岛屿。

全株有清热解毒作用；广西民间用作治肝炎、风火眼痛。

27. 匙羹藤属*——*Gymnema* R. Br.

R. Br. in Mem. Wern. Soc. **1**: 33. 1810.

* 匙羹藤属(中国种子植物科属辞典)，别名武靴叶属(种子植物名称)。