

冠近钟状或辐状，花冠筒短，裂片 5 枚，狭长，远较花冠筒长，向右覆盖；副花冠鳞片 5 枚，着生于花冠湾缺处，与花冠裂片互生，顶端具细齿；花药直立，顶端具膜片，内折覆盖着柱头的基部，花丝合生成短筒；花粉块每室 1 个，直立，顶端具透明的小尖头；子房由 2 枚离生心皮组成，花柱极短，柱头盘状五角形，顶端 2 裂。蓇葖双生，圆柱状披针形；种子顶端具白色绢质种毛。

8 种，分布于亚洲东部和东南部。我国产 1 种，分布于华南和西南部。

本属模式种为：*Pentasacme caudatum* Wall.

石萝藦 五来(植物学名词审查本)；水杨柳(广西)；南石萝藦(广西药用植物名录)；假了刁竹(广西)；凤尾草(广东)；满草(广东海南) 图版 153

Pentasacme championii Benth. in Journ. Bot. Kew Misc. **5**: 54. 1853, et Fl. Hongkong. 228. 1861; Tsiang in Sunyatsenia **2**: 199. 1934; 中国高等植物图鉴, **3**: 493, 图 4940. 1974; 海南植物志, **3**: 264, 图 713. 1974. ——*Pentasacme caudatum* sensu Merr. in Lingnan Sci. Journ. **5**: 152. 1927, non Wall.

多年生直立草本，高 30—80 厘米，通常不分枝，节间短，长 1.5—3 厘米，无毛。叶膜质，狭披针形，长 4—16 厘米，宽 0.5—1.5 厘米，顶端长尖，基部急尖；中脉两面凸起，侧脉不明显；叶柄极短，长 1—2 毫米。伞形状聚伞花序腋生，比叶为短，着花 4—8 朵；花序梗极短或近无梗；花梗纤细，长 3—6 毫米；花蕾急尖或渐尖，花长 1 厘米，直径 5 毫米；花萼裂片狭披针形，长约 1.5 毫米；花冠白色，裂片狭披针形，远比花冠筒长，长 6 毫米，基部略宽；副花冠成 5 鳞片，顶端具细齿，着生于花冠湾缺处，与花冠裂片互生；花药顶端膜片内折覆盖着柱头基部；花粉块卵圆形，直立，顶端具透明钩状的小尖头，中部与花粉块柄联结；子房无毛，柱头盘状五角形，顶端 2 裂。蓇葖双生，圆柱状披针形，长约 6 厘米，直径 3 毫米，无毛；种子小，顶端具白色绢质种毛；种毛长 1.5 厘米。花期 4—10 月，果期 7 月—翌年 4 月。

产于湖南、广东、广西和云南等省区。生长于丘陵山地疏林下或溪边、石缝、林谷中。分布于越南。模式标本采自我国广东南部岛屿。

全株有清热解毒作用；广西民间用作治肝炎、风火眼痛。

27. 匙羹藤属*——*Gymnema* R. Br.

R. Br. in Mem. Wern. Soc. **1**: 33. 1810.

* 匙羹藤属(中国种子植物科属辞典)，别名武靴叶属(种子植物名称)。



图版 153 石萝藦 *Pentasacme championii* Benth., 1.花枝; 2.花; 3.花冠展开示副花冠; 4.合蕊柱; 5.雌蕊; 6.花萼展开示腺体; 7.花粉器; 8.蓇葖; 9.种子。(吴翠云仿绘)