

1.5 厘米;花蕾顶端锥状;花萼裂片长圆形,与花冠筒等长,具缘毛,内面基部有腺体;花冠黄色,钟状,裂片长圆形,钝头,具缘毛;副花冠退化成 5 行被毛的条带,着生于花冠筒的中部;花药顶端的膜片仅达柱头的基部;花粉块长圆形,直立,着粉腺长达花粉块一半;子房无毛,柱头圆头状,比花药长。蓇葖广披针状圆柱形,长 9—12 厘米,宽 2—5 厘米,基部肿大,外果皮坚硬,内果皮黄色;种子卵形,扁平,长 12—14 毫米,宽 5 毫米,有薄边,顶端具白色绢质种毛;种毛长 4.5 厘米。花期 5—7 月,果期 6 月—翌年 1 月。

产于广东、广西、贵州和云南。生长于山地溪边林中或灌木丛中。分布于印度、越南、菲律宾、马来西亚和印度尼西亚。模式标本采自印度。

根可药用,广西民间用作治风湿。广东民间用全株治小儿麻痹症。

5. 广东匙羹藤(海南植物志) 猪满芋(广州)

Gymnema inodorum (Lour.) Decne. in DC. Prodr. **8**: 551. 1844; Cost. in Lec. et Humb. Fl. Gén. Indo-Chine **4**: 87. 1912; Merr. in Lingnan Sci. Journ. **13**: 45. 1934, et in Trans. Am. Philos. Soc. **24**(2): 319. 1935; Tsiang in Sunyatsenia **6**: 135. 1941; 海南植物志, **3**: 266. 1974. ——*Cynanchum inodorum* Lour. Fl. Cochinch. 166. 1790.

木质藤本。叶膜质,卵形或卵状长圆形,长 4—11 厘米,宽 2—8 厘米,顶端渐尖,基部圆形或浅心形,无毛或脉上稍被微毛;侧脉每边 4—6 条,斜曲上升;叶柄长 2—4 厘米,纤细,无毛或被疏微毛,顶端具少数丛生腺体。聚伞花序伞形状,腋生,长 1.5—4 厘米,着花多朵;花萼裂片披针形,比花冠筒短,长 2—3 毫米,外面被微毛,内面基部有小腺体;花冠淡黄色,钟状,外面被疏微毛,裂片长圆形,钝头;副花冠着生在花冠筒壁内面中部而退化成 5 行被毛的条带;花药顶端的膜片比柱头低;花粉块长圆形,直立,着粉腺远比花粉块小;柱头钝圆锥状,比花药为长。蓇葖披针状圆柱形,长 8.5—11 厘米,直径 2 厘米,顶端渐尖,基部膨大,无毛;种子卵形,长 1.2—1.5 厘米,宽约 7 毫米,有薄边缘,基部圆形,顶端具白色绢质种毛;种毛长 3.5 厘米。花期 5—7 月,果期 7 月—翌年 1 月。

产于广东、广西、贵州和云南。生长于山地溪边林中或灌木丛中。分布于越南、印度尼西亚。模式标本采自越南。

6. 海南匙羹藤(植物分类学报)

Gymnema hainanense Tsiang in Acta Phytotax. Sinica **10**: 37, Pl. 9. 1965; 海南植物志, **3**: 267. 1974.