

木质藤本,长3米;嫩枝被短柔毛,老枝无毛,被疏皮孔。叶膜质或薄纸质,长圆形或长圆状椭圆形,长3.5—8.5厘米,宽1.5—3.5厘米,顶端短急尖,具短尖头,基部圆形或浅心形,叶面除中脉被短柔毛外,无毛,叶背被短柔毛;叶脉两面略扁平,侧脉纤细,每边4—5条,未达叶缘即网结;叶柄长2—3.5毫米,被短柔毛,顶端具丛生小腺体。聚伞花序假伞形状,腋生,被短柔毛,长和宽约1.5厘米,比叶为短,着花20—30朵;花序梗长3—7毫米;花梗长5毫米;花小,花蕾圆形;花萼裂片卵圆形,长1毫米,具缘毛,花萼内面基部具5个小腺体;花冠钟状,花冠筒比花萼裂片略长,花冠裂片长圆形,长1毫米,宽0.5毫米,镊合状排列;副花冠着生在花冠筒壁上而退化或5行离生被毛的条带,条带顶端鳞片状;花丝合生成短筒,花药顶端的膜片仅达柱头的基部;花粉块长圆形,直立,着粉腺比花粉块短一半;子房无毛,柱头圆球状,圆顶。花期8月。

产于广东海南。生长于山坑密林中。模式标本采自东方县浩壁岭。

7. 华宁藤(中国高等植物图鉴) 藤子化石胆、化肉藤(云南弥勒)

Gymnema foetidum Tsiang in Sunyatsenia 6: 133, Pl. 25, fig. 16. 1941.

7a. 华宁藤(原变种) 图版 158

Gymnema foetidum Tsiang var. **foetidum**

藤状灌木,除花序和叶柄外无毛;枝条具皮孔。叶厚纸质,椭圆形至椭圆状长圆形,长4—5.5厘米,宽1.5—2.5厘米(最大的 9.5×4 厘米),顶端急尖或短渐尖,基部楔形;侧脉每边5—6条;叶柄长5—10毫米,被疏长柔毛,顶端具丛生小腺体。聚伞花序假伞形状,腋生,与叶柄等长或较短,着花5—8朵;花序梗和花序被微柔毛;花萼裂片长圆形,长3毫米,宽1.5毫米,外面被疏短柔毛,花萼内面基部有5—6个腺体;花冠黄白色,钟状辐形,无毛,花冠筒与花萼裂片等长,花冠裂片长圆形,长2毫米,宽1.5毫米,钝头,顶端微凹;副花冠着生在花冠筒壁上而成5行被毛条带,条带顶端具细长的鳞片达花冠喉部;花药顶端的膜片比柱头为低;花粉块长圆形,直立,比着粉腺长一倍;柱头圆头状,到达花冠喉部。蓇葖通常单生,长圆状,长8厘米,直径1.5厘米,无毛;种子长卵形,长1.4厘米,宽6毫米,扁平,基部圆形,顶端白色绢质种毛;种毛长3厘米。花期3—4月,果期秋季。

产于云南中部。生长于山地疏林中。模式标本采自云南华宁县。

7b. 毛脉华宁藤(中国高等植物图鉴)

Gymnema foetidum Tsiang var. **mairei** Tsiang in Sunyatsenia 6: 134. 1941.

与原变种的不同之处在于:叶脉被短柔毛;花萼裂片内面无腺体;副花冠成丛毛条带的顶端无鳞片状。