

闭着柱头的膜片;子房由2枚离生心皮组成,花柱圆锥状,柱头五角状凸起;花粉块每室一个,直立。蓇葖双生,披针状柱圆形;种子顶端具有白色绢质种毛。

约15种,分布于非洲、大洋洲和亚洲热带和亚热带地区。我国产1种,分布于西南及华南。

本属模式种为: *Gongronema nepalense* (Wall.) Decne.

纤冠藤(海南植物志) 细羊角、羊乳藤、睡地金牛、入地龙、乳汁藤、大防己(广西);牛奶树(广东) 图版160

Gongronema nepalense (Wall.) Decne. in DC. Prodr. 8: 624. 1844; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 33. 1883; K. Schum. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4, 2: 287. 1895; Cost. in Lec. et Humb. Fl. Gén. Indo-Chine 3: 91, fig. 13(12—14). 1912; Tsiang in Sunyatsenia 2: 198. 1934, op. cit. 4: 121. 1939; 中国高等植物图鉴, 3: 495, 图 4944, 1974; 海南植物志, 3: 267, 图 715. 1974. —*Gymnema nepalense* Wall. Tent. Fl. Nep. 50, t. 38. 1826.

木质藤本,具乳汁。叶坚纸质,椭圆形或卵圆形,长6—14厘米,宽2—8厘米,顶端短渐尖,基部圆形或浅心形,无毛;侧脉每边5—7条,在叶背凸起;叶柄长1—3厘米,顶端具丛生腺体。伞形状聚伞花序腋生,二至三歧,比叶为长;花小,黄白色;花萼裂片卵圆形,外面被微毛,花萼内面基部有5个腺体;花冠淡黄色,近钟状,裂片长圆形,外面被微毛,内面无毛,向右覆盖;副花冠为5个扁平而短的膜片,组成环状,着生于合蕊冠的基部;花粉块长圆形,直立在水平伸展的花粉块柄上;子房无毛,花柱短,上部膨大,柱头短圆锥状,基部五角形。蓇葖双生,披针状圆柱形,长4.5—8厘米,直径5—7毫米,无毛;种子长卵形,长4毫米,宽1.5毫米,顶端具白色绢质种毛;种毛长2.5厘米。花期6—9月,果期8月—翌年1月。

产于广东、广西、云南、贵州、西藏。生长于海拔500—1400米山地林中或山坡水沟边灌木丛中。分布于尼泊尔和印度。模式标本采自尼泊尔。

全株供药用,有补精、通奶、祛风、消肿、祛湿毒作用,广西民间有用作治腿痛、跌打、子宫下垂。茎皮纤维韧,可作麻织品和造纸原料。

29. 豹皮花属*——*Stapelia* Linn.

Linn. Gen. Pl. 3: 102. 1754; H. Jacobsen, Handb. Succul.

* 豹皮花属(中国高等植物图鉴),别名五星国徽属(北京植物志)。



图版 160 纤冠藤 *Gongronema nepalense* (Wall.) Decne., 1.花枝; 2.花; 3.花萼展开示腺体; 4.合蕊柱和副花冠; 5.雌蕊; 6.花粉器; 7.蓇葖; 8.种子。(吴翠云仿绘)