

成伞形花序腋生，或总状花序顶生；花梗纤细而极短；花萼 5 裂，内面基部具 5 个腺体；花冠钟状或辐状，裂片 5 枚，伸长，镊合状排列；副花冠着生在合蕊冠上，环状，顶端 5—10 裂，直立或反折，其中 5 裂片再分 3 小裂，小裂片呈舌状，或副花冠裂片呈宽膜片；合蕊柱短；花药顶端无膜质附属物；花粉块每室 1 个，直立，花粉块柄短；子房由 2 枚离生心皮组成，花柱短，柱头近扁平。蓇葖双生，细长；种子顶端被白色绢质种毛。

约 30 种，分布于非洲、大洋洲及亚洲东南部。我国产 2 种，分布于云南和广西。

本属模式种为：*Brachystelma tuberosum* R. Er

润肺草（中国高等植物图鉴） 地饼（广西南宁）、短梗藤（俗称） 图版 162

Brachytelma edule Coll. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 28: 89, Pl. 14. 1890; Tsiang in Sunyatsenia 6: 130. 1941; 中国高等植物图鉴, 3: 496, 图 4946, 1974.

多年生直立草本，高 5—15 厘米；茎柔弱，不分枝，无毛或被微毛，节间短；块根圆球状至卵圆状，直径 1.5—2 厘米。叶对生，稀在下部互生，线状披针形，长 2—4 厘米，宽 2—3 毫米，绿色，无毛；无叶柄或极短；叶腋内具有针状腺体。总状花序顶生，花梗柔弱极短；花萼裂片卵状披针形，镊合状排列；副花冠环状，5—10 裂，反折，有 5 裂片再分 3 小裂，小裂片呈舌状；花药顶端无膜质附属物；花粉块卵圆状，直立。蓇葖双生，细长，长约 9 厘米，直径 4 毫米；种子长圆形，顶端具种毛。花期 10 月。

产于云南和广西。生长于海拔 300—1200 米山地林下。分布于缅甸。模式标本采自缅甸。

块根可食用，有作润肺药。

广西上思还发现有长节润肺草 *B. kerrii* Craib., 植株较高，节间较长。

31. 夜来香属*——*Telosma* Coville

Coville in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. 9: 384.

1905.

藤状灌木，具乳汁。叶对生，膜质，具长柄，羽状脉。伞形状或总状的聚伞花序腋生，着花多朵；花中等大；花萼 5 深裂，裂片双盖覆瓦状排列，花萼内面基部具有 5 个小腺体；花冠膜质，高脚碟状，花冠筒圆筒状，花冠喉部通常紧缩，裂片 5，长圆形或狭

* 夜来香属（植物学名词审查本）。

长圆形,向右覆盖;副花冠5片,膜质,着生于合蕊冠的基部,腹部粘生在花药背面,其边缘及顶端均离生,直立,顶端渐尖成舌状内弯,背面凸起之顶向内凹缺;雄蕊5,着生于花冠的基部,腹部粘生于雌蕊上,花丝短,合生成筒状,花药顶端有内弯的膜片;花粉块每室1个,长圆形,直立;子房由2枚离生心皮组成,花柱短柱状,柱头头状或短圆锥状。蓇葖圆柱状披针形,无毛;种子顶端具白色绢质的种毛。

约10种,分布于亚洲、大洋洲及非洲热带地区。我国产4种,分布于华南和西南地区。

本属模式种为: *Telosma cordata* (Burm. f.) Merr.

分种检索表

1. 叶基部深心形。

2. 花冠裂片披针形;副花冠长过花药顶端;花微香…… 1. 台湾夜来香 *T. pallida* (Roxb.) Craib

2. 花冠裂片长圆形;副花冠短于花药;花有清香味…… 2. 夜来香 *T. cordata* (Burm. f.) Merr.

1. 叶基部楔形、圆形、截平或微心形。

3. 叶基部楔形或圆形;花冠干时有纵褶,有白兰香味…… 3. 华南夜来香 *T. cathayensis* Merr.

3. 叶基部通常截形,稀微心形;花冠干时无纵褶,无香味 ……………

…………… 4. 卧茎夜来香 *T. procumbens* (Blanco) Merr.

1. 台湾夜来香(新拟)

Telosma pallida (Roxb.) Craib in Kew Bull. 1911: 418. 1911. — *Asclepias pallida* Roxb. Fl. Ind. 2: 49. 1824. — *Pergularia pallida* Wight et Arn. in Wight, Contrib. Bot. Ind. 42. 1834; Wight, Ic. Pl. Ind. Or. 2: t. 585. 1843.

藤状灌木,具乳汁;茎和枝柔细,被微毛。叶膜质,卵状心形,长6—8厘米,宽3—5厘米,顶端渐尖,基部心形,无毛;基脉5条,侧脉每边4—5条;叶柄长2.5—3.5厘米,顶端具丛生小腺体。聚伞花序伞形状,腋生;花序梗长7—15毫米;花梗长5—12毫米;花微香;花萼裂片卵状披针形,被缘毛,内面基部有小腺体;花冠黄白色,高脚碟状,花冠筒圆筒形,与裂片近等长或短,内面喉部被柔毛,花冠裂片披针形,向右覆盖,无毛;副花冠5片,膜质,着生于合蕊冠上,腹部与花药背面粘生,侧边和顶端离生,副花冠裂片背面凸起,顶端舌状渐尖,高出花药顶端;花药顶端具卵状内弯的膜片;花粉块长圆形,直立;子房无毛,心皮离生,每心皮有胚珠多个,花柱短圆柱状,柱头短圆锥状,基部五棱,顶端微凹。蓇葖长圆状披针形,长5.5—10厘米;种子卵圆形,长5—8毫米,顶端具白色绢质种毛;种毛长2.5厘米。花期8月,果期秋冬季。

产于我国台湾。生长于山地林中,攀援树上。分布于印度、泰国和越南等。模式