

花柱短,膨大,柱头膨大,基部五角形,顶端不明显2裂。蓇葖长披针形,长12厘米,直径1厘米,渐尖,无毛;种子长圆形,长约1厘米,顶端具白色绢质种毛;种毛长约2.5厘米。花期5—6月,果期9—10月。

产于四川、贵州、广西、广东、湖南、福建、浙江和台湾等省区。生长于海拔500米以下山地疏密林中,攀援于大树上。菲律宾也有栽培。模式标本采自菲律宾(栽培的种子来源于我国广东南部岛屿)。

2. 假木通(中国高等植物图鉴) 假土木通(广西药用植物名录) 图版175

Stephanotis chunii Tsiang in Sunyatsenia **3**: 165, Pl. 18, fig. 11. 1936, op. cit. **6**: 140. 1940; 中国高等植物图鉴, **3**: 504, 图4961. 1974.

藤状灌木;嫩枝被微毛,老枝无毛,直径2毫米,节间长10—15厘米。叶纸质,卵形或宽卵状长圆形,长7—10.5厘米,宽4—6.5厘米,端部渐尖,基部心形,嫩叶被微毛,老时渐脱落;侧脉近扁平,每边6—7条,斜曲上升,叶缘前网结;叶柄长1—2厘米,被短柔毛,顶端具丛生腺体。聚伞花序伞形状,腋生,比叶为短,着花多至11朵;花序梗长1—1.5厘米,密被短柔毛;花梗长1.5厘米,密被短柔毛;花萼裂片长圆形,钝头,长5毫米,宽2毫米,外面被短柔毛,花萼内面基部具有许多腺体;花冠白色,高脚碟状,有香味,含有丰富的黑色液汁,花冠筒圆筒形,长7—8毫米,外面无毛,内面具5行2列粗毛,裂片长圆状镰刀形,长7毫米,具有缘毛;合蕊柱比花冠筒短;花药顶端膜片长圆形,在柱头顶端粘闭;副花冠小,着生于雄蕊背面,5片,裂片扁平,比花药为短;花粉块每室1个,卵圆形,直立,花粉块柄横生,着粉腺宽卵形;子房无毛,心皮2枚离生,胚珠每室多个,花柱短,膨大,柱头膨大,顶端钝,基部五角形。花期5—6月。

产于广东和广西。生长于海拔600—850米山地潮湿密林中,攀援于大树上。模式标本采自广东鼎湖山。

根可药用,通筋络。

3. 云南黑鳗藤(植物分类学报)

Stephanotis saxatilis Tsiang et P. T. Li in Acta Phytotax. Sinica **12**: 118. Pl. 26. 1974.

藤状灌木;枝纤细,灰白色,被2列短柔毛。叶薄纸质,椭圆形至长圆状披针形,长5.5—10厘米,宽1—3.5厘米,顶端长渐尖,基部宽楔形,两面无毛;中脉和侧脉在叶面扁平,在叶背凸起,侧脉每边7条,疏离至叶缘网结;叶柄长1—1.5厘米,被短柔毛,顶端具有丛生5—8个腺体。聚伞花序伞形状,生于叶柄之间,长达叶的一半,着花

12 朵;花序梗长 3—4 厘米,被短柔毛;花梗长 1 厘米,被短柔毛;花萼裂片长卵形,长 3 毫米,宽 1 毫米,外面被短柔毛,内面无腺体;花冠淡绿色,高脚碟状,花冠筒圆筒形,基部膨大,长 7 毫米,外面无毛,内面基部具有 5 行两列毛,花冠裂片长圆状镰刀形,长 1 厘米,宽 3 毫米,向右覆盖;雄蕊的副花冠 5 片,裂片卵圆形,顶端稍钝,到达花药基部;花药近四方形,药隔顶端的膜片长圆形,内弯,高出柱头并在柱头上粘闭;花粉块每室 1 个,长圆形,直立,花粉块柄短;子房无毛,心皮离生,胚珠每室多个,花柱短,柱头头状,顶端不明显 2 裂。花期 5 月。

产于云南东南部。生长于海拔 1100 米山地石山灌木丛中。模式标本采自富宁。

组 2. 茶药藤组 Sect. *Jasminanthes* (Bl.) Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 114. 1889; K. Schum. in Engl. u. Prantl, Pflanzenfam. **4**, **2**: 288. 1895.——*Jasminanthes* Bl. Mus. Bot. Lugd.-Bat. **1**: 148, t. 28. 1850.

雄蕊上无副花冠;花粉块无柄。

本组产 1 种,分布我国云南和泰国。

4. 茶药藤(静生汇报)

Stephanotis pilosa Kerr in Kew Bull. **1938**: 453. 1938; Tsiang et P. T. Li in Acta Phytotax. Sinica **12**: 118. 1974.——*Huthamnus sinicus* Tsiang, 静生汇报, **9**: 10, 图版 3. 1939.

藤状灌木,长约 7 米,具乳汁;小枝、叶、花序和花萼均密被黄色绒毛。叶近革质,卵圆形,长 9—19 厘米,宽 4—12 厘米,顶端急尖具短尖头,基部心形;中脉和侧脉在叶面扁平,在叶背凸起,侧脉每边 7—10 条,60°—80° 角度斜升,至叶缘前网结;叶柄长 1—4.5 厘米。聚伞花序伞形状,腋生,着花 3—6 朵;花序梗长 2 厘米;花梗长 1 厘米;小苞片线形;花萼裂片大,叶状,长圆状披针形,长 2.6 厘米,宽 8 毫米,内面基部无腺体;花大,长 5.6 厘米,直径 4.5 厘米;花冠白色,高脚碟状,花冠筒圆筒状,中部以上渐狭,基部膨大,长 5 厘米,中部直径 4 毫米,基部直径 5 毫米,外面被疏柔毛,内面基部具有 5 行疏柔毛,花冠裂片长圆状镰刀形,长 3.5 厘米,宽 1.3 厘米,外面被疏柔毛,内面无毛,具缘毛,向右覆盖;无副花冠;雄蕊与雌蕊粘生,花药近四方形,彼此连生,腹部粘生在柱头上,药隔顶端的膜片长圆形,在柱头顶粘闭;花粉块每室 1 个,长圆形,直立,无花粉块柄,着粉腺卵圆形;子房无毛,心皮离生,胚珠每室多个,花柱短,柱头圆锥状,基部膨大五角形,顶端钝,2 裂。蓇葖披针形,粗壮,长 21 厘米,直径 2.7 厘米,顶端渐尖,基部膨大,淡绿色,无毛;种子扁平,卵圆形,长 2 厘米,宽 1 厘米,有薄边,