

标本采自印度尼西亚爪哇。

花美丽,广东南部公园栽培作观赏植物。

35. 金凤藤属*——*Dolichopetalum* Tsiang

Tsiang in Acta Bot. Sinica 15: 137. 1973.

藤状灌木;茎和叶被有黄色长柔毛。叶对生,卵圆状心脏形;基脉掌状5出;叶柄顶端具有10个丛生的小腺体。聚伞花序腋生,总状式;花萼5深裂,裂片双盖覆瓦状排列,萼筒喉部具有许多小腺体;花冠骨盆状,裂片镊合状排列,下部宽卵形而上部退化成为极长钻状的尾;副花冠扁平,贴生于合蕊柱的背面,5深裂,裂片长圆状四方形,顶端微缺;着粉腺比花粉块略长;子房由2枚离生心皮组成,圆球状,花柱短,柱头五角形,其顶端微缺;每心皮有胚珠多数。蓇葖单生,线状披针形,平滑;种子椭圆形,有边缘,顶端具丝状的种毛。

1种,产于我国广西西部和贵州。

本属模式种为: *Dolichopetalum kwangsiense* Tsiang

金凤藤(广西) 广西长梗藤(广西植物名录) 图版 177

Dolichopetalum kwangsiense Tsiang in Acta Bot. Sinica 15: 137, Pl. 1. 1973;
中国高等植物图鉴, 3: 505, 图 4963. 1974.

藤状灌木;茎和叶被有黄色长柔毛,老时变黑灰色,茎直径约3毫米,节间长8—16厘米。叶纸质,卵圆状心脏形,长8—12厘米,宽4.2—7厘米,顶端短渐尖,基部心脏形;基脉掌状5出,侧脉每边约5条,弧形上升,远离叶缘网结;叶柄长2.5—3.5厘米,被有长柔毛,其顶端具有10个丛生的小腺体。聚伞花序总状式,长约8厘米,着花1—3朵;小苞片卵圆形,长4毫米,宽1毫米,顶端长尖;花萼5深裂,外面被长柔毛,裂片长圆状披针形,长3毫米,宽0.7毫米,在萼筒喉部有25个小腺体;花冠紫色,骨盆状,外面被长柔毛,内面无毛,花冠筒长2毫米,裂片镊合状排列,近基部宽卵形,向端部退化成极长钻状的尾,尾长12毫米,被缘毛;副花冠扁平,贴生于合蕊柱的背面,5深裂,裂片长圆状四方形,微缺,长0.5毫米,宽0.3毫米;花药近四方形,长1.5毫米,顶端丝状;花粉块每室1个,直立,着粉腺比花粉块柄略长;子房由2枚离生心皮组成,圆球状,无毛,花柱短,柱头五角形,顶端略为微缺,每心皮有胚珠多数。蓇葖单生,线状披针形,长6.5—11厘米,直径1.5厘米,平滑;种子椭圆形,长1.4厘米,宽5毫

* 金凤藤属(植物分类学报)。