

柱头厚而顶端具圆锥状凸起。蓇葖披针状圆柱形,长12厘米,直径约3厘米,外果皮被白粉,具多皱棱条或纵肋;种子广卵形,长1.2厘米,宽6毫米,扁平,有薄边,棕黄色,顶端具白色绢质种毛;种毛长4.5厘米。花期4—9月,果期7—12月。

产于贵州、云南、广西、广东及台湾等省区。生长于海拔500米以下山地林中,常攀援于大树上,间有栽培于农村中。分布于印度、孟加拉、泰国、越南、印度尼西亚和菲律宾。模式标本采自孟加拉。

茎皮纤维可作人造棉、绳索;种毛作填充物。根可药用,作催吐药;茎利尿、止肚痛,除郁湿;全株可治胃热和胃痛。果皮的白霜可作兽医药。嫩叶可食。

2. 丽子藤(植物分类学报) 滇假夜来香(云南植物名录)

Dregea yunnanensis (Tsiang) Tsiang et P. T. Li in Acta Phytotax. Sinica **12**: 129. 1974. — *Wattakaka yunnanensis* Tsiang in Sunyatsenia **4**: 126. 1939, op. cit. **6**: 150. fig. 19. 1941.

2a. 丽子藤(原变种) 图版184

Dregea yunnanensis (Tsiang) Tsiang et P. T. Li var. **yunnanensis**

攀援灌木,全株具乳汁,除花冠和合蕊柱外,全株均被小茸毛,老茎被毛渐脱落。叶纸质,卵圆形,长1.3—3厘米,宽0.9—2.5厘米,基部心形,叶面被短柔毛,叶背被淡黄色的微茸毛,老渐脱落;侧脉每边约4条,在叶背凸起;叶柄长0.5—2.5厘米,顶端具3—4个丛生小腺体。伞形状聚伞花序腋生,长达5厘米,着花达15朵;花萼裂片卵圆形,花萼内面基部具5个小腺体;花冠白色,辐状,裂片卵圆形,长5毫米,宽3.5毫米,顶端钝而微凹,具脉纹,边缘被缘毛;副花冠裂片肉质,背面圆球状凸起,顶端内角延伸成尖角,与花药顶端的膜片近等高;花粉块长圆状,直立;子房被疏柔毛,花柱短圆柱状,柱头圆锥状,基部五角形,顶端短2裂。蓇葖披针形,长3.5—5厘米,直径5—7毫米,外果皮被微毛,老渐脱落,平滑无皱褶;种子卵圆形,长7毫米,宽4毫米,顶端具白色绢质种毛;种毛长2厘米。花期4—8月,果期10月。

产于云南、四川和甘肃等省。生长于海拔3500米以下山地林中。模式标本采自云南。

2b. 大丽子藤(植物分类学报)

Dregea yunnanensis (Tsiang) Tsiang et P. T. Li var. **major** (Tsiang) Tsiang et P. T. Li in Acta Phytotax. Sinica **12**: 129. 1974. — *Wattakaka yunnanensis* Tsiang var. **major** Tsiang in Sunyatsenia **6**: 151. 1941.

与原变种的不同在于:叶长达8厘米,宽达5.5厘米;花直径11—12毫米。花