

期 8 月,果期 10—12 月。

产于云南和四川。生长于山地林中。模式标本采自云南丽江。

3. 苦绳(浙江) 奶浆藤(云南、贵州);隔山撬、白丝藤、白浆草(云南);小木通、通炎散、刀愈药(云南昆明);野泡通(贵州)

Dregea sinensis Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 115. 1889; K. Schum. in Engl. u. Prantl, Natürl. Pflanzenfam. **4**, **2**: 293. 1895; 中国高等植物图鉴, **3**: 509, 图 4972. 1974.——*Wattakaka sinensis* (Hemsl.) Stapf in Curtis's Bot. Mag. t. 8976. 1923; Tsiang in Sunyatsenia **2**: 201. 1934, op. cit. **6**: 151. 1941; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**: 1003. 1936.

3a. 苦绳(原变种) 图版 185 (1—8)

Dregea sinensis Hemsl. var. **sinensis**

攀援木质藤本;茎具皮孔,幼枝具褐色绒毛。叶纸质,卵状心形或近圆形,长 5—11 厘米,宽 4—6 厘米,叶面被短柔毛,老渐脱落,叶背被绒毛;侧脉每边约 5 条;叶柄长 1.5—4 厘米,被绒毛,顶端具丛生小腺体。伞形状聚伞花序腋生,着花多达 20 朵;花萼裂片卵圆形至卵状长圆形,花萼内面基部有 5 个腺体;花冠内面紫红色,外面白色,辐状,直径 1—1.6 厘米,裂片卵圆形,长 6—7 毫米,宽 4—6 毫米,顶端钝而有微凹,具缘毛;副花冠裂片肉质,肿胀,端部内角锐尖;花药顶端具膜片;花粉块长圆形,直立;子房无毛,心皮离生,柱头圆锥状,基部五角形,顶端 2 裂。蓇葖狭披针形,长 5—6 厘米,直径约 1 厘米,外果皮具波纹,被短柔毛;种子扁平,卵状长圆形,长 9 毫米,宽 5 毫米,顶端具白色绢质种毛;种毛长 2 厘米。花期 4—8 月,果期 7—10 月。

产于浙江、江苏、湖北、广西、云南、贵州、四川、甘肃、陕西等省区。生长于海拔 500—3000 米山地疏林中或灌木丛中。模式标本采自湖北宜昌。

茎皮纤维可制人造棉;种毛可作填充物。药用全株,民间用作催乳、止咳、祛风湿;叶外敷可治外伤肿痛、疖疔、骨折等。

3b. 贯筋藤(植物名实图考) 奶浆果(云南);刀口药(四川) 图版 185 (9—13)

Dregea sinensis Hemsl. var. **corrugata** (Schneid.) Tsiang et P. T. Li in Acta Phytotax. Sinica **12**: 129. 1974.——*D. corrugata* Schneid. in Sargent, Pl. Wils. **3**:

图版 184 丽子藤 **Dregea yunnanensis** (Tsiang) Tsiang et P. T. Li var. **yunnanensis**, 1. 花枝; 2. 花; 3. 合蕊柱和副花冠; 4. 雄蕊侧面观,示背面副花冠着生; 5. 雄蕊腹面观; 6. 雌蕊; 7. 花粉器; 8. 蓇葖。(杨可四绘)