

353. 1916.—*Wattakaka corrugata* (Schneid.) Stapf in Curtis's Bot. Mag. **148**: sub t. 8976. 1923.—*W. sinensis* (Hemsl.) Stapf var. *corrugata* (Schneid.) Tsiang in Sunyatsenia **6**: 152, fig. 20. 1941.

与原变种的不同在于：蓇葖外果皮具横凸起的皱褶片状；子房被柔毛。花期 3—5 月，果期 7—12 月。

产于云南、贵州、四川、甘肃、陕西等省区。生长于山地灌木丛中。模式标本采自四川小金。

4. 楔叶南山藤(植物分类学报) 图版 186

Dregea cuneifolia Tsiang et P. T. Li in Acta Phytotax. Sinica **12**: 127. Pl. 29. 1974.

攀援木质藤本，具乳汁；茎具单列短柔毛，节间长 7.5—9.5 厘米，直径 2 毫米，灰绿色；叶腋内具长圆状腺体。叶膜质，长椭圆形，长 5.5—9.5 厘米，宽 2—3.5 厘米，顶端渐尖，基部楔形至宽楔形，叶面深绿色，叶背浅绿色，两面被疏微毛；侧脉两面扁平，每边 5—6 条；叶柄长 1—1.5 厘米，被微毛，顶端具 8—11 个丛生棕色小腺体。伞形状聚伞花序腋生或腋外生，单生，着花多达 30 朵；花序梗细长，长 7—13 厘米，被微毛；花梗长 1.2—1.7 厘米，被疏微毛或几无毛，基部具有甚多小苞片，小苞片被微毛；花萼 5 深裂，裂片卵圆形，长 1.5 毫米，宽 1 毫米，外面被微毛，内面无毛，花萼内面基部有 5 个腺体；花冠绿白色，辐状，直径 9 毫米，花冠筒长约 2 毫米，裂片 5 枚，卵状三角形，长和宽均 4 毫米，被缘毛；合蕊柱露出花冠喉部，长 3 毫米；副花冠裂片着生于雄蕊的背面，肉质，圆球状凸起，顶端内侧有尖角；花药长圆形，顶端具膜片，花丝合生成短筒；花粉块每室 1 个，匙形，直立，花粉块柄短，着粉腺长圆形，远比花粉块为小；子房由 2 枚离生心皮组成，无毛，花柱短，柱头顶端圆锥状，基部环状；每心皮有胚珠多颗。花期 7 月。

产于广西北部。生长于海拔 720 米山地密林中及山坡路旁。模式标本采自九万大山。

38. 荟蔓藤属*——*Cosmostigma* Wight

Wight, Contrib. Bot. Ind. 41. 1834.

藤状灌木。叶对生。聚伞花序总状式或伞形式；花萼 5 深裂，内面基部具腺体；

* 荟蔓藤属(海南植物志)，别名闾柱藤属(中国种子植物科属辞典)。

花冠辐状,裂片5枚,镊合状排列或向右覆盖;副花冠为5枚扁平的裂片组成,贴生于雄蕊背部,裂片顶端两裂或全缘;花药四方形,边缘软骨质;花粉块每室1个,长圆形,直立,花粉块柄上升,在中部曲折;子房由2枚离生心皮组成;柱头宽大,盘状五角形,与花药等长。蓇葖大形,狭长圆形;种子顶端具白色绢质种毛。

约3种,分布于亚洲热带和亚热带地区。我国产1种,产于广东海南。

本属模式种为: *Cosmostigma racemosum* (Roxb.) Wight

荃蔓藤(广东海南) 图版187

Cosmostigma hainanense Tsiang in Sunyatsenia 6: 156, Pl. 29, et fig. 21. 1941; 中国高等植物图鉴, 3: 510, 图4973. 1974; 海南植物志, 3: 275, 图720. 1974.

藤状灌木;枝条具黄色柔毛。叶薄膜质,卵圆状心脏形,长5—11厘米,宽4—8厘米,顶端短渐尖,基部圆形,两面被疏柔毛;侧脉每边约7条,基脉近掌状;叶柄长2.5—3.5厘米,被疏柔毛,顶端具有丛生小腺体。聚伞花序近伞形状,腋生,着花6—15朵,长3.5—5厘米;小苞片、花序梗、花梗及花萼均被黄色柔毛;花萼内面基部有腺体10个;花冠黄绿色,辐状,直径5毫米;花冠筒长1毫米,内面喉部被柔毛,裂片长圆形,长2毫米,宽1毫米,钝头,无毛;副花冠5片,每片扁平,顶端全缘,比雄蕊为短;花药四方形,边缘软骨质,顶端具圆形薄膜片;花粉块长圆形,直立,花粉块柄在中部弯曲,着粉腺长过花粉块;子房无毛,柱头扁平,顶端全缘。蓇葖未见。花期5月。

产于广东海南。生长于山地林谷中。模式标本采自保亭。

39. 眼树莲属*——*Dischidia* R. Br.

R. Br. in Mem. Wern. Soc. 1: 32. 1810.

藤本,常攀附在树上或石上,或攀援半灌木,具乳汁;茎肉质,节上生根。叶对生,稀无叶,肉质。聚伞花序腋生,小形;花序梗极短;花小,黄白色;花萼5深裂,内面基部有5个腺体;花冠坛状,花冠喉部紧缩,裂片5,短而厚,镊合状排列;副花冠由5枚锚状片组成,着生于合蕊冠上,直立,顶端2裂或全缘;合蕊冠极短;花粉块每室1个,长圆状,直立,边缘透明;花药顶端具极短的薄膜片;子房由2枚离生心皮组成;柱头平顶或圆锥状。蓇葖双生或单生,披针状圆柱形,顶端渐狭;种子顶端具白色绢质种

* 眼树莲属(海南植物志),别名瓜子金属(植物分类学报)。