

Dischidia esquirolii (Lév.) Tsiang in Sunyatsenia 3: 183. 1936, op. cit. 4: 127. 1939; 中国高等植物图鉴 3: 511, 图 4975. 1974. — *Hoya esquirolii* Lév. in Fedde, Rep. Sp. Nov. 11: 289. 1912.

肉质附生藤本,具乳汁,全株无毛,节上生根。叶卵圆状椭圆形,长 1.8—2 厘米,宽 1.5 厘米,顶端钝,稀具短尖头,基部楔形或圆形;侧脉明显,每边约 4 条。聚伞花序腋生;花序梗短;花小,长 3.5 毫米,直径 2 毫米;花萼裂片卵圆形,无毛;花冠白色,坛状,花冠喉部加厚,无毛或近无毛,裂片卵状三角形,长 1 毫米,宽 0.5 毫米,中部加厚,镊合状排列;副花冠裂片锚状,顶端 2 裂而展开向下弯,中间无乳头状突起;花药卵状三角形;花粉块长圆形,直立,花粉块柄顶端膨大;子房无毛,柱头基部五角形,顶端具小尖头。蓇葖线状圆筒形,长 5—5.5 厘米,直径 2 毫米,无毛;种子长圆形,长 3 毫米,顶端具白色绢质种毛;种毛长 2 厘米。花期 3—5 月,果期 7—12 月。

产于广西、贵州和云南。生长于海拔 300—1200 米的山地杂木林中及岩石上。模式标本采自贵州。

3. 眼树莲(广东) 石仙桃、小耳环、上树瓜子、树上瓜子、上树鳖、翼鱼草(广西);瓜子藤(广东);瓜子金(广西、广东) 图版 188


Dischidia chinensis Champ. ex Benth. in Journ. Bot. Kew Misc. 5: 55. 1853; Tsiang in Sunyatsenia 3: 181. 1936; 中国高等植物图鉴, 3: 510, 图 4974. 1974; 海南植物志, 3: 276, 图 721. 1974.

藤本,常攀附于树上或石上,全株含有乳汁;茎肉质,节上生根,绿色,无毛。叶肉质,卵圆状椭圆形,长 1.5—2.5 厘米,宽 1 厘米,顶端圆形,无短尖头,基部楔形,叶柄长约 2 毫米。聚伞花序腋生,近无柄,有瘤状凸起;花极小,花萼裂片卵圆形,长和宽约 1 毫米,具缘毛;花冠黄白色,坛状,花冠喉部紧缩,加厚,被疏长柔毛,裂片三角状卵形,钝头,长和宽约 1 毫米;副花冠裂片锚状,具柄,顶端 2 裂,裂片线形,展开而下折,其中间有细小圆形的乳头状凸起;花粉块长圆状,直立,花粉块柄顶端增厚。蓇葖披针状圆柱形,长 5—8 厘米,直径 4 毫米;种子顶端具白色绢质种毛。花期 4—5 月,果期 5—6 月。

产于广东和广西。生长于山地潮湿杂木林中或山谷、溪边,攀附在树上或附生石上。模式标本采自广东沿海岛屿。

全株供药用,有清肺热、化疔、凉血解毒之效;民间有用作治肺燥咳血、疮疖肿毒,小儿疳积、痢疾、跌打肿痛、毒蛇咬伤。

4. 尖叶眼树莲(植物分类学报) 南瓜子金(广西药用植物名录);石瓜子、川甲



图版 188 眼树莲 *Dischidia chinensis* Champ. ex Benth., 1.花枝; 2.花; 3.花萼展开示腺体; 4.花冠展开; 5.合蕊柱和副花冠; 6.雌蕊; 7.花粉器; 8.蓇葖; 9.种子。(陈国泽仿绘)