

Dischidia esquirolii (Lév.) Tsiang in Sunyatsenia 3: 183. 1936, op. cit. 4: 127. 1939; 中国高等植物图鉴 3: 511, 图 4975. 1974. — *Hoya esquirolii* Lév. in Fedde, Rep. Sp. Nov. 11: 289. 1912.

肉质附生藤本,具乳汁,全株无毛,节上生根。叶卵圆状椭圆形,长 1.8—2 厘米,宽 1.5 厘米,顶端钝,稀具短尖头,基部楔形或圆形;侧脉明显,每边约 4 条。聚伞花序腋生;花序梗短;花小,长 3.5 毫米,直径 2 毫米;花萼裂片卵圆形,无毛;花冠白色,坛状,花冠喉部加厚,无毛或近无毛,裂片卵状三角形,长 1 毫米,宽 0.5 毫米,中部加厚,镊合状排列;副花冠裂片锚状,顶端 2 裂而展开向下弯,中间无乳头状突起;花药卵状三角形;花粉块长圆形,直立,花粉块柄顶端膨大;子房无毛,柱头基部五角形,顶端具小尖头。蓇葖线状圆筒形,长 5—5.5 厘米,直径 2 毫米,无毛;种子长圆形,长 3 毫米,顶端具白色绢质种毛;种毛长 2 厘米。花期 3—5 月,果期 7—12 月。

产于广西、贵州和云南。生长于海拔 300—1200 米的山地杂木林中及岩石上。模式标本采自贵州。

3. 眼树莲(广东) 石仙桃、小耳环、上树瓜子、树上瓜子、上树鳖、翼鱼草(广西);瓜子藤(广东);瓜子金(广西、广东) 图版 188

Dischidia chinensis Champ. ex Benth. in Journ. Bot. Kew Misc. 5: 55. 1853; Tsiang in Sunyatsenia 3: 181. 1936; 中国高等植物图鉴, 3: 510, 图 4974. 1974; 海南植物志, 3: 276, 图 721. 1974.

藤本,常攀附于树上或石上,全株含有乳汁;茎肉质,节上生根,绿色,无毛。叶肉质,卵圆状椭圆形,长 1.5—2.5 厘米,宽 1 厘米,顶端圆形,无短尖头,基部楔形,叶柄长约 2 毫米。聚伞花序腋生,近无柄,有瘤状凸起;花极小,花萼裂片卵圆形,长和宽约 1 毫米,具缘毛;花冠黄白色,坛状,花冠喉部紧缩,加厚,被疏长柔毛,裂片三角状卵形,钝头,长和宽约 1 毫米;副花冠裂片锚状,具柄,顶端 2 裂,裂片线形,展开而下折,其中间有细小圆形的乳头状凸起;花粉块长圆状,直立,花粉块柄顶端增厚。蓇葖披针状圆柱形,长 5—8 厘米,直径 4 毫米;种子顶端具白色绢质种毛。花期 4—5 月,果期 5—6 月。

产于广东和广西。生长于山地潮湿杂木林中或山谷、溪边,攀附在树上或附生石上。模式标本采自广东沿海岛屿。

全株供药用,有清肺热、化疰、凉血解毒之效;民间有用作治肺燥咳血、疮疖肿毒,小儿疳积、痢疾、跌打肿痛、毒蛇咬伤。

4. 尖叶眼树莲(植物分类学报) 南瓜子金(广西药用植物名录);石瓜子、川甲

草、马榴根、上树瓜(广西) 图版 189

Dischidia australis Tsiang et P. T. Li in Acta Phytotax. Sinica **12**: 130. Pl. 30. 1974.

藤本, 缠附在树上, 全株具白色乳汁, 茎绿色。叶肉质, 窄椭圆形, 长 3—4 厘米, 宽 0.7—1.1 厘米, 两端渐尖, 无毛; 叶脉不明显; 叶柄长 3—4 毫米。聚伞花序腋外生; 总花梗短而厚, 长 1.5—5 毫米; 花小; 花蕾黄色略带红, 顶端尖; 花萼 5 深裂, 裂片宽卵形, 长和宽约 1 毫米, 无毛, 双盖覆瓦状排列, 花萼内面基部具 5 个腺体; 花冠白色, 坛状, 花冠喉部紧缩, 花冠筒长 3 毫米, 喉部被倒生长柔毛, 裂片 5 枚, 镊合状排列, 向外张开, 裂片卵状三角形, 长 1 毫米, 宽 0.5 毫米, 内面中部加厚; 副花冠裂片呈锚状, 着生于合蕊冠基部, 顶端全缘; 花药顶端具小而尖薄膜片; 花粉块每室 1 个, 长圆形, 直立, 花粉块柄顶端膨大; 子房由 2 枚离生心皮组成, 无毛, 柱头盘状五角形, 顶端具尖头。蓇葖未见。 花期 3 月。

产于云南和广西。生于海拔 500 米山地疏林中。模式标本采自云南金平。

全株供药用, 广西民间有用作治哮喘、咳嗽、湿疹、疮痒、关节炎等。

5. 小叶眼树莲(海南植物志) 上别木(广东) 图版 190

Dischidia minor (Vahl) Merr. in Lingnan Sci. Journ. **13**: 67. 1934; Tsiang in Sunyatsenia **3**: 181. 1936; 海南植物志, **3**: 277 1974.——*Collyris minor* Vahl in Skrift. Nat. Selsk. Kobenh. **6**: 111. 1810.


附生肉质藤本, 节上生根。叶圆形, 长和宽约 1 厘米, 绿白色, 无毛; 叶脉不明显; 叶柄长 1 毫米。聚伞花序腋生; 花序梗极短; 花萼裂片卵圆形, 长和宽 0.5 毫米, 无毛; 花冠白色或黄白色, 坛状, 花冠喉部被长柔毛, 裂片卵状三角形, 长 1 毫米, 宽 0.5 毫米, 中部加厚; 副花冠裂片锚状, 比合蕊柱短, 顶端 2 裂而下弯; 花药顶端卵状三角形; 花粉块长圆状, 直立, 花粉块柄顶端膨大; 子房无毛, 柱头基部五角形, 顶端具尖头。蓇葖披针状圆柱形, 长 4 厘米, 直径 5 毫米; 种子顶端具白色绢质种毛。 花期 1—5 月, 果期 5—8 月。

产于云南、广东和福建。生长于山地林谷中。分布于印度、越南、马来西亚。模式标本采自马来西亚。

6. 台湾眼树莲(新拟) 图版 191

Dischidia formosana Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. **23**: 385. 1877.

肉质附生藤本, 具乳汁, 无毛, 节间长 2—5 厘米, 节上生根。叶圆形, 长 1—1.2 厘米, 宽 7—10 毫米, 顶端微凹; 叶脉不明显; 叶柄长 2—4 毫米。聚伞花序腋生; 花序梗



图版 189 尖叶眼树莲 *Dischidia australis* Tsiang et P. T. Li, 1.花枝; 2.花; 3.花萼展开示腺体; 4.花冠一部分内面观,示裂片内面增厚及花冠喉部具倒生毛; 5.雌蕊; 6.副花冠和合蕊柱; 7.雄蕊背面观; 8.雄蕊腹面观; 9.花粉器。(陈国泽绘)