

极短,着花2—4朵;花梗长2—3毫米;花萼裂片卵圆形,长和宽1毫米;花冠坛状,长4.5毫米,裂片长圆状三角形,长2毫米,宽1毫米,顶端渐尖,中部加厚,外面无毛,内面中部及中部以下的边缘被长柔毛;副花冠比合蕊柱高,裂片锚状,顶端截平;花药顶端长圆状三角形;花粉块长圆状,直立,花粉块柄顶端膨大;子房无毛,柱头基部五角形,顶端具尖头,2裂。蓇葖线状圆筒形,长4.5厘米,直径3毫米;种子顶端具白色绢质种毛。花期4月,果期7月。

产于我国台湾。生长于山地杂木林中,附生于大树上。模式标本采自台湾。

#### 7. 云南眼树莲(植物分类学报)

***Dischidia chinghungensis*** Tsiang et P. T. Li in *Acta Phytotax. Sinica* **12**: 130, Pl. 31. 1974.

攀援半灌木,附生于树上;枝条被短柔毛。叶肉质,宽卵圆形,长1—1.5厘米,宽7—11毫米,顶端急尖至钝,基部圆形至截形,两面无毛;叶脉不明显;叶柄长1.5厘米,被短柔毛;节间比叶为短,叶较多而密集排列。花白色。蓇葖单生,线状披针形,长7—9厘米,直径3—4毫米,绿色,无毛,下垂;种子线形,长2.5毫米,宽0.3毫米,褐色,顶端具白色绢质种毛;种毛长2厘米。花期6月,果期7—10月。

产于云南南部等地。生长于海拔1500—2000米山地密林中。模式标本采自景洪。

### 40. 马兰藤属\*——*Dischidanthus* Tsiang

Tsiang in *Sunyatsenia* **3**: 184. 1936.

柔弱藤本。叶对生,具柄,羽状脉。团集聚伞花序腋生,花细小;花萼5深裂,内面基部有腺体5枚;花冠坛状,花冠喉部紧缩,裂片5枚,略向右覆盖;生于花冠上的副花冠位于花冠裂片的弯缺处,加厚,生于雄蕊背部的副花冠为5个肉质、小镰刀状、直立的裂片;花药顶端有内折而急尖的膜片;花粉块每室1个,长圆状,直立;子房由2枚离生心皮组成,柱头圆锥状,基部五角形。蓇葖双生,线状圆柱形;种子顶端具白色绢质种毛。

1种,分布于我国和越南、老挝、柬埔寨。

本属模式种为: *Dischidanthus urceolatus* (Decne.) Tsiang

**马兰藤**(广东海南) 假瓜子金(俗称);金腰带(湖南) 图版 192

\* 马兰藤属(海南植物志),别名假瓜子金属(植物分类学报)。