

约 5 厘米,直径 2 厘米,着花多朵;花梗纤细丝状;花小,紫红色;花萼 5 深裂,裂片披针形,外面被微毛,花萼内面基部腺体 2 齿裂;花冠辐状,裂片长圆形,具缘毛,内面具疏长柔毛;副花冠裂片隆肿,卵圆状,贴生于合蕊冠上;花粉块每室 1 个,长圆状,平展;子房由 2 枚离生心皮所组成,无毛;柱头顶端扁平。蓇葖双生,披针形,长 4—5.5 厘米,直径 7 毫米,顶端渐尖,无毛;种子顶端具黄白色种毛;种毛长 2.5 厘米。花期 5—8 月,果期 8—11 月。

产于云南、贵州和四川。生长于海拔 2000 米以下山坡、向阳旷野及草地上。模式标本采自云南大理。

根可药用,云南民间用作:消炎解毒、退热截疟、祛风湿;种毛外用可止血。

4. 花溪娃儿藤(植物分类学报) 飞菜(贵州)

Tylophora anthopotamica (Hand.-Mazz.) Tsiang et Zhang in Acta Phytotax. Sinica 12: 133. 1974. — *Cynanchum anthopotamicum* Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 995, fig. 30 (5—7). 1936.

攀援灌木,长约 1 米;须根丛生;茎不分枝,上部缠绕状,被微硬毛。叶披针形,长 4—11 厘米,宽 1—2 厘米,顶端渐尖,基部宽楔形,被小粗伏毛;侧脉每边 12—16 条;叶柄长 3—5 毫米,密被微硬毛。聚伞花序腋生,近总状,着花数朵;花序梗长 2.5 厘米,被微硬毛,基部具小苞片;花梗长 5—8 毫米,柔弱;花萼裂片三角状披针形,长 1.5 毫米,顶端渐尖,反卷;花冠辐状,5 深裂,无毛,裂片三角状披针形,长 5—6 毫米,顶端钝,外弯;副花冠裂片 5 枚,生于合蕊冠上,圆球状三角形至圆球形,背面隆肿,顶端急尖,近达合蕊柱顶端;花药顶端具卵状膜质,内弯向柱头;花粉块每室 1 个,椭圆状,直立;子房的心皮离生;柱头五角状。花期 6 月。

产于贵州西南部。生长于海拔 850 米的山地林中。模式标本采自贵州。

本种花序柔弱、纤细,副花冠圆球状三角形,背面隆肿,不是扁平,花粉块直立,不是下垂的特征,应属于娃儿藤属较为合理。

5. 斑胶藤(广西)

Tylophora longipedicellata Tsiang et P. T. Li in Acta Phytotax. Sinica 12: 136, Pl. 33. 1974.

攀援灌木;枝纤细,缠绕,直径约 2 毫米,具纵条纹,枝条和叶柄具单列短柔毛,老茎秃净。叶薄膜质,卵状披针形,长 4.5—8 厘米,宽 2—3.3 厘米,顶端渐尖,基部圆形,除叶面中脉有微毛外,两面无毛;中脉在叶面扁平,在叶背凸起,侧脉两面均扁平,每边 6—7 条,弯曲上升,未达叶缘即网结;叶柄长 0.5—1.3 厘米,顶端具丛生小腺体。