

产于广东南部和广西南部。生长于海边沙地及平原旷野灌木丛中。模式标本采自广东陵水。

根可药用,华南民间有用作治跌打瘀肿、毒蛇咬伤等。

19. 紫叶娃儿藤(海南植物志) 图版 206

Tylophora picta Tsiang in Sunyatsenia 3: 218, Pl. 25, fig. 16. 1936; 海南植物志, 3: 279. 1974.


攀援灌木,高6米;小枝无毛或近节处被黄色疏柔毛,节间长10—25厘米。叶近革质,卵圆形或卵状长圆形,长6—11厘米,宽3.5—8.5厘米,顶端急尖,基部圆形或楔形,稀微心形,除基部有黄色长柔毛外,其余无毛,叶背紫红色,老时褪色;侧脉每边4—7条,中脉与侧脉均扁平;叶柄长2—4厘米,稍扁平,顶端具丛生腺体;叶腋内具浅黑色被黄色柔毛的腺体。聚伞花序腋生,长2—5厘米,直径3厘米,着花16—30朵;花序梗紫红色;苞片与小苞片被黄色长柔毛;花长2—6毫米,直径9毫米;花萼裂片卵状三角形,长1.5毫米,宽1毫米,外面被黄色长柔毛,花萼内面基部无腺体;花冠辐状,紫红色,外面被黄色长柔毛,内面被短柔毛,裂片卵状长圆形,长3毫米,宽1毫米,顶端钝;副花冠裂片卵球状,肉质肿胀,贴生于合蕊冠基部,顶端钝,到达药隔基部;花粉块每室1个,长圆形,平展;花药顶端膜片内弯;子房无毛,柱头盘状五角形。蓇葖双生,披针状圆柱形,长8厘米,直径1厘米,顶端长渐尖,紫红色,无毛;种子卵圆形,长1厘米,宽5毫米,棕色,有边缘,顶端具白色绢质种毛;种毛长4.5厘米。花期5—9月,果期10—12月。

产于广东海南。生长于林谷中。模式标本采自保亭。

20. 膜叶娃儿藤(植物分类学报)

Tylophora membranacea Tsiang et P. T. Li in Acta Phytotax. Sinica 12: 141, Pl. 36. 1974.

多年生草质藤本;枝柔细,具单列柔毛,节间长13—15厘米,直径2毫米。叶薄膜质,卵圆形至宽卵圆形,长6.5—14厘米,宽4—7.5厘米,顶端急尖,基部截形或浅心形,两面无毛;中脉和侧脉在叶的两面均扁平,侧脉每边5—6条,斜曲上升,未达叶缘即网结,不甚明显;叶柄扁平,长1.7—2.5厘米,顶端具丛生腺体。聚伞花序二至三歧,腋外生,比叶为短;总花梗和花梗纤细,无毛;花黄白色,直径达1厘米;花萼5深裂,裂片卵形,长1毫米,宽0.5毫米,两面无毛,内面基部无腺体;花冠辐状,裂片长圆形,长4毫米,宽2.5毫米,外面无毛,内面被柔毛,镊合状排列;副花冠裂片卵圆形,肉质隆肿,着生于合蕊冠的基部,顶端急尖,到达花药的基部;花粉块每室1个,长



图版 206 紫叶娃儿藤 *Tylophora picta* Tsiang, 1.花果枝; 2.花蕾; 3.花; 4.花萼; 5.雄蕊腹面观; 6.雄蕊侧面观,示背面副花冠着生; 7.雌蕊; 8.子房纵切面; 9.子房横切面; 10.花粉器。(吴翠云绘)