

圓形,近平展;花药近方形,顶端具圓形膜片;子房由 2 枚离生心皮组成,无毛,花柱丝状,柱头盘状五角形。 花期 6 月。

产于广西的东部。生长于山地林中。模式标本采自古城。

21. 紫花娃儿藤(中国高等植物图鉴) 图版 207

Tylophora henryi Warb. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **3**: 313. 1907; Tsiang in Sunyatsenia **4**: 130. 1939.


多年生草质藤本;须根丛生;茎和叶柄具单列柔毛。叶纸质,卵形至宽卵形,长 7.5—16 厘米,宽 3—13 厘米,顶端渐尖至急尖,基部近心形至圆形,除叶面中脉有微毛外,叶的两面均无毛;中脉和侧脉在叶面扁平,在叶背凸起,侧脉每边 5—6 条;叶柄长 2—6 厘米,顶端具丛生腺体;叶脉内腺体小,或无。聚伞花序伞房状,一至二歧腋生或腋外生,着花多朵;花序梗长达 3 厘米,有时极短,被微毛,有时无毛,花梗长 5—10 毫米,柔细;花紫色,直径 9 毫米;花萼裂片披针形,长 1 毫米,宽 0.3 毫米,有缘毛,花萼内面基部具 5 枚腺体;花冠辐状,裂片宽卵形,长 2 毫米,宽 1.5 毫米,外面无毛,内面具疏微毛;副花冠裂片近方形,贴生于合蕊冠上,肉质,基部狭窄,上部较宽,顶端截平,高达药隔的基部;花药顶端具圓形内弯膜片;花粉块每室 1 个,圆球状,平展;子房无毛,柱头盘状五角形。蓇葖通常单生,披针形,长约 8 厘米,直径 0.8 厘米,无毛;种子顶端具白色绢质种毛。 花期 6—8 月,果期 8—11 月。

产于湖北、河南、四川和贵州。生长于山地林下。模式标本采自湖北。

22. 扒地蜈蚣(广西) 假白前(广西) 图版 208

Tylophora renchangii Tsiang in Sunyatsenia **3**: 232. Pl. 28. 1936; 中国高等植物图鉴, **3**: 517, 图 4988. 1974; 海南植物志, **3**: 282. 1974.

攀援或缠绕灌木,长达 3 米;茎灰褐色,具纵条纹,被微毛,老渐脱落。叶薄纸质,椭圆状长圆形或长圆状披针形,长 5—6.5 厘米,宽 1.5—3 厘米,顶端急尖或短渐尖,有时具小尖头,基部楔形,稀圆形,无毛,边缘下卷;侧脉不明显,每边约 5 条,纤细。聚伞花序假伞形状,腋生,比叶为短,着花 5—6 朵;花序梗比花梗短,花梗纤细柔弱,不等长,无毛;小苞片钻状渐尖,被柔毛;花萼 5 深裂,外面被柔毛,内面基部有 5 个腺体;花冠白绿色,辐状,花冠筒长 2 毫米,裂片卵状长圆形,镊合状排列;副花冠裂片卵圆形,肉质隆肿,顶端短渐尖;花药近正方形,顶端具圓形膜片;花粉块每室 1 个,圆球状,平展;子房无毛;柱头盘状五角形。蓇葖披针形,长 6.5 厘米,直径 1 厘米,无毛;种子宽卵形,扁平,长 4 毫米,宽 2 毫米,顶端具白色绢质种毛;种毛长 2 厘米。 花期 4—8 月,果期 9—12 月。



图版 207 紫花娃儿藤 *Tylophora henryi* Warb., 1.花枝; 2.花; 3.花萼; 4.花冠展开; 5.合蕊柱和副花冠; 6.副花冠裂片腹面观; 7.雄蕊腹面观; 8.雌蕊; 9.花粉器。(陈国泽绘)