

产于广东、广西。生长于海拔 500 米以下山地疏林中及平原旷野灌木丛中。分布于越南。模式标本采自广西十万大山。

根可药用,治跌打损伤、骨折。鲜叶可外用治毒蛇咬伤。

23. 普定娃儿藤(中国高等植物图鉴) 图版 209

Tylophora tengii Tsiang in Sunyatsenia 3: 228, Pl. 27, fig. 18. 1936.

藤状半灌木;茎纤细,无毛或有微毛。叶薄纸质,长圆形或长圆状披针形,长 2.5—4 厘米,宽 0.8—1.3 厘米,顶端急尖,基部浅心形,除叶面中脉被微毛外,两面均无毛;中脉和侧脉在叶面凸起,在叶背扁平,不明显,侧脉每边 3—4 条;叶柄长 5—10 毫米,被单列微毛。聚伞花序腋生,比叶为短,着花 10—16 朵,1—2 歧,长 1—1.5 厘米,无毛;花萼裂片长圆状披针形,长 1 毫米,宽 0.5 毫米,具缘毛,花萼内面基部有 5 个腺体;花冠白绿色,辐状,两面被短柔毛,花冠筒短,裂片宽卵圆形,长 3 毫米,宽 5 毫米;副花冠裂片卵圆形,贴生于合蕊冠基部,肉质,隆肿,顶端到达药隔基部;花药顶端具圆形的膜片;花粉块每室 1 个,圆球状,平展;子房无毛;柱头盘状,顶端凸起。花期 5 月。

产于贵州南部。生长于山地林中。模式标本采自普定。


24. 小叶娃儿藤(海南植物志)

Tylophora tenuis Bl. Bijdr. 1062. 1826; Tsiang in Sunyatsenia 3: 234. 1936, op. cit. 4: 129. 1939; 海南植物志, 3: 281. 1974.

攀援半灌木;茎柔细,嫩枝被微毛,老时脱净。叶薄纸质,叶形及大小变异甚大,一般为卵圆状椭圆形或长圆形,长 1—4 厘米,宽 0.5—2 厘米,顶端钝或急尖,有时具细尖头,基部急尖或圆形,两面无毛,边缘具缘毛;中脉在叶面扁平,在叶背凸起,侧脉两面均扁平,不明显;叶柄长 0.5—1 厘米,被短柔毛。聚伞花序伞形状,腋生,着花不多;花梗纤细,长 1.5 厘米;花萼裂片卵圆形,无毛,顶端急尖,花萼内面基部有 5 个腺体;花冠白色,辐状,直径 5 毫米,外面无毛,内面有时被短柔毛,裂片卵状长圆形或卵状三角形;副花冠裂片隆肿;花粉块每室 1 个,圆球状,平展或近直立。蓇葖双生,披针形,或披针状圆柱形,长 4—8 厘米,宽 6—9 毫米,外果皮膜质,无毛;种子卵形,长 6 毫米,顶端具白色绢质种毛;种毛长 1.5 厘米。花期 4—12 月,果期 7—12 月。

产于陕西、云南、广西、广东和台湾。生长于山地疏林中及旷野灌木丛中。分布于印度、斯里兰卡、越南、马来西亚和印度尼西亚。模式标本采自印度尼西亚。

25. 广花娃儿藤(海南植物志) 图版 210



图版 209 普定娃儿藤 *Tylophora tengii* Tsiang. 1.花枝； 2.花； 3.花萼内面观示腺体； 4.雄蕊腹面观； 5.雄蕊侧面观； 6.雌蕊； 7.子房纵切面示胚珠着生； 8.子房横切面； 9.花粉器。（吴翠云绘）