

产于云南东南部。生长于海拔 1350 米山地林中。模式标本采自屏边。

7. 吊灯花族——Trib. *Ceropegieae* Benth. et Hook. f.

Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 2: 730, 778. 1876.

花药直立, 没有膜质的附属物, 每个花粉器有花粉块 2 个, 在每个药室内藏有 1 个, 直立, 在顶端内角具有显著而透明的边缘。

44. 吊灯花属*——*Ceropegia* Linn.

Linn. Sp. Pl. 211. 1753, et Gen. Pl. 5th Ed. 100. 1754.

多年生草木, 有时基部近木质, 根部经常成块茎; 茎近肉质, 缠绕或直立。叶薄膜质或近肉质。聚伞花序具花序梗或无梗, 着花甚多或仅具单花, 通常近伞形; 花萼深 5 裂; 花冠筒状, 基部略作一面膨胀, 近漏斗状, 裂片舌状, 直立, 经常弧形, 顶端经常粘合, 具缘毛, 基部为镊合状排列; 雄蕊着生的副花冠为两轮, 钟状或辐状, 5、10 或 15 裂, 裂片比花药略为长, 舌状; 花药顶端无膜片; 花粉块每室 1 个, 直立, 圆形, 其内角具透明的膜边; 柱头扁平。蒴果圆筒状, 平滑; 种子顶端具种毛。

约 170 种, 分布于亚洲东南部, 经印度、马达加斯加, 到非洲; 我国产 14 种, 主要分布于西南各省区。

本属模式种为: *Ceropegia candelabrum* Linn.

分 种 检 索 表

1. 茎直立。
 2. 块状根。
 3. 叶椭圆形…………… 1. 丽江吊灯花 *C. aridicola* W. W. Sm.
 3. 叶线状披针形…………… 2. 河坝吊灯花 *C. sootepensis* Craib
 2. 圆柱状根; 叶卵圆形或披针形…………… 3. 金雀马尾参 *C. mairei* (Lév.) H. Huber
1. 茎缠绕。
 4. 叶卵形或卵状长圆形。
 5. 叶的顶端锐尖。
 6. 叶的基部心形…………… 4. 宝兴吊灯花 *C. paohsingensis* Tsiang et P. T. Li
 6. 叶的基部圆形或近截形。
 7. 花序梗极短, 长不到 5 毫米, 着花 1—3 朵……………

* 吊灯花属(种子植物名称), 别名蜡花属(中国种子植物科属辞典)。

- 5. 短序吊灯花 *C. christenseniana* Hand.-Mazz.
 7. 花序梗长达13毫米, 着花1—8朵..... 6. 马鞍山吊灯花 *C. teniana* Hand.-Mazz.
 5. 叶的顶端长渐尖。
 8. 外轮副花冠5裂..... 7. 西藏吊灯花 *C. pubescens* Wall.
 8. 外轮副花冠10裂。
 9. 叶长4—8厘米, 宽3—5厘米, 基部圆形... 8. 白马吊灯花 *C. monticola* W. W. Sm.
 9. 叶长2.5—6.5厘米, 宽1.3厘米, 基部近心形... 9. 巴东吊灯花 *C. driophila* Schneid.
 4. 叶线形或线状披针形或长圆状披针形。
 10. 叶线形或线状披针形。
 11. 叶长达7厘米, 宽7毫米..... 10. 狭叶吊灯花 *C. stenophylla* Schneid.
 11. 叶长5—12厘米, 宽0.8—2厘米..... 11. 长叶吊灯花 *C. dolichophylla* Schltr.
 10. 叶长圆状披针形。
 12. 内轮副花冠被散生的长硬毛..... 12. 吊灯花 *C. trichantha* Hemsl.
 12. 内轮副花冠无毛。
 13. 花序着花达13朵, 花喉部宽达8毫米..... 13. 柳叶吊灯花 *C. salicifolia* H. Huber
 13. 花序着花1—4朵, 花喉部宽3毫米..... 14. 木里吊灯花 *C. muliensis* W. W. Sm.

1. 丽江吊灯花(中国高等植物图鉴) 图版 216

Ceropegia aridicola W. W. Sm. in Not. Bot. Gard. Edinb. **12**: 197. 1920;
 Tsiang in Sunyatsenia **4**: 88, Pl. 24. 1939; H. Huber in Mem. Soc. Brot. **12**: 53.
 1957.

直立草本, 高15—50厘米; 块茎近圆形, 直径3厘米; 茎1—2歧, 略为倾卧, 下部无叶, 被微柔毛。叶狭三角形, 长0.5—1.5厘米, 宽3—10毫米, 顶端渐尖, 基部心形及戟形, 全缘或略作波状, 叶面略具柔毛, 叶背近无毛; 中脉明显具疏柔毛, 侧脉不明显; 叶柄长4—6毫米, 具疏柔毛。聚伞花序生于顶端叶腋内, 着花1—3朵; 花梗长3—10毫米, 被疏柔毛; 花萼长3—4毫米, 裂片线状披针形, 顶端渐尖, 无毛或具微毛; 花冠长1.5厘米, 基部近球形, 宽4毫米, 花冠筒部长5毫米, 外面略具长柔毛, 内面无毛, 裂片卵圆状披针形或近菱形; 副花冠外轮酒杯状, 顶端裂片卵圆形或三角形, 无毛, 内轮舌状、线状匙形, 比外轮长一倍, 略呈紫红色。蓇葖长约4.5厘米; 种子长5毫米; 种毛白色绢质。花期7月, 果期秋季。

产于云南丽江至中甸间的金沙江边。生长于海拔1500米的干旱草地。模式标本采自云南金沙江边大具坝。

2. 河坝吊灯花(中国高等植物图鉴) 乾浆豆(四川)

Ceropegia sootepensis Craib in Kew Bull. **1911**: 420. 1911; Cost. in Lec. et Humb. Fl. Gén. Indo-Chine **4**: 152. 1912; H. Huber in Mem. Soc. Brot. **12**: 52.