

- 5. 短序吊灯花 *C. christenseniana* Hand.-Mazz.
 7. 花序梗长达13毫米, 着花1—8朵..... 6. 马鞍山吊灯花 *C. teniana* Hand.-Mazz.
 5. 叶的顶端长渐尖。
 8. 外轮副花冠5裂..... 7. 西藏吊灯花 *C. pubescens* Wall.
 8. 外轮副花冠10裂。
 9. 叶长4—8厘米, 宽3—5厘米, 基部圆形... 8. 白马吊灯花 *C. monticola* W. W. Sm.
 9. 叶长2.5—6.5厘米, 宽1.3厘米, 基部近心形... 9. 巴东吊灯花 *C. driophila* Schneid.
 4. 叶线形或线状披针形或长圆状披针形。
 10. 叶线形或线状披针形。
 11. 叶长达7厘米, 宽7毫米..... 10. 狭叶吊灯花 *C. stenophylla* Schneid.
 11. 叶长5—12厘米, 宽0.8—2厘米..... 11. 长叶吊灯花 *C. dolichophylla* Schltr.
 10. 叶长圆状披针形。
 12. 内轮副花冠被散生的长硬毛..... 12. 吊灯花 *C. trichantha* Hemsl.
 12. 内轮副花冠无毛。
 13. 花序着花达13朵, 花喉部宽达8毫米..... 13. 柳叶吊灯花 *C. salicifolia* H. Huber
 13. 花序着花1—4朵, 花喉部宽3毫米..... 14. 木里吊灯花 *C. muliensis* W. W. Sm.

1. 丽江吊灯花(中国高等植物图鉴) 图版 216

Ceropegia aridicola W. W. Sm. in Not. Bot. Gard. Edinb. **12**: 197. 1920;
 Tsiang in Sunyatsenia **4**: 88, Pl. 24. 1939; H. Huber in Mem. Soc. Brot. **12**: 53.
 1957.

直立草本, 高15—50厘米; 块茎近圆形, 直径3厘米; 茎1—2歧, 略为倾卧, 下部无叶, 被微柔毛。叶狭三角形, 长0.5—1.5厘米, 宽3—10毫米, 顶端渐尖, 基部心形及戟形, 全缘或略作波状, 叶面略具柔毛, 叶背近无毛; 中脉明显具疏柔毛, 侧脉不明显; 叶柄长4—6毫米, 具疏柔毛。聚伞花序生于顶端叶腋内, 着花1—3朵; 花梗长3—10毫米, 被疏柔毛; 花萼长3—4毫米, 裂片线状披针形, 顶端渐尖, 无毛或具微毛; 花冠长1.5厘米, 基部近球形, 宽4毫米, 花冠筒部长5毫米, 外面略具长柔毛, 内面无毛, 裂片卵圆状披针形或近菱形; 副花冠外轮酒杯状, 顶端裂片卵圆形或三角形, 无毛, 内轮舌状、线状匙形, 比外轮长一倍, 略呈紫红色。蓇葖长约4.5厘米; 种子长5毫米; 种毛白色绢质。花期7月, 果期秋季。

产于云南丽江至中甸间的金沙江边。生长于海拔1500米的干旱草地。模式标本采自云南金沙江边大具坝。

2. 河坝吊灯花(中国高等植物图鉴) 乾浆豆(四川)

Ceropegia sootepensis Craib in Kew Bull. **1911**: 420. 1911; Cost. in Lec. et Humb. Fl. Gén. Indo-Chine **4**: 152. 1912; H. Huber in Mem. Soc. Brot. **12**: 52.

1957.

草质藤本；茎纤弱，草黄色，被微柔毛。叶线形或狭线状披针形，长 3.5—7.5 厘米，宽 2—3 毫米，顶端渐尖，基部楔形；中脉明显，侧脉模糊不清，叶面略具微毛，叶背无毛，边缘下卷；叶柄极短，或下面的长达 1 厘米。伞形聚伞花序腋生，着花不多，近无花序梗；花梗长达 9 毫米，近无毛；花萼裂片披针形，长约 5 毫米，急尖；花冠长达 5 厘米，基部椭圆形，在中间收缩，裂片长 2 厘米；副花冠外轮狭窄，长 1.5 毫米，内轮高出外轮两倍。蓇葖双生，线状披针形，长 8—9 厘米，直径约 3 毫米，向顶端渐狭，成长渐尖，基部楔形，外果皮草黄色，有细条纹，无毛；种子暗褐色，长圆形，长约 7 毫米，宽 3 毫米，顶端截形，基部圆形；种毛白色绢质，长约 2 厘米。花期 6 月，果期 7 月。

产于四川马尔康县。生长于海拔 2400 米山村附近。分布于泰国。模式标本采自泰国。

3. 金雀马尾参 (植物名实图考) 太子参 (云南楚雄)；普吉藤 (中国高等植物图鉴)

Ceropegia mairei (Lév.) H. Huber in Mem. Soc. Brot. **12**: 43. 1957; 中国高等植物图鉴, **3**: 520, 图 4993. 1974. — *Aristolochia mairei* Lév. in Bull. Geogr. Bot. **22**: 228. 1912. — *A. viridiflora* Lév. in Fedde, Rep. Spec. Nov. **12**: 99. 1913. — *A. viridiflora* var. *occlusa* Lév. l. c. **12**: 190. 1913. — *A. blinii* Lév. l. c. **12**: 287. 1913. — *Ceropegia balfouriana* Schltr. in Mot. Bot. Gard. Edinb. **8**: 18. 1913; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**: 998. 1936; Rehd. in Journ. Arn. Arb. **18**: 240. 1937; Tsiang in Sunyatsenia **4**: 89. 1939.

多年生草本；茎上部缠绕，下部直立，高达 35 厘米；根部丛生，肉质；茎部单独，曲折，近基部无叶，具微毛。叶直立展开，椭圆形或椭圆状披针形，长 0.9—4 厘米，在中间最宽处 4—12 毫米，顶端急尖或短渐尖，叶面及叶柄具微柔毛，叶背除中脉外无毛，边缘略为反卷。聚伞花序近无梗，少花；花梗长约 1 厘米，具微毛；花萼裂片狭披针形，长 5 毫米；花冠长约 3 厘米，近圆形，花冠筒近圆筒状，直径约 4.5 毫米，花冠喉部略为膨大，裂片舌状长圆形，内面具微毛，与花冠筒等长，长 1.2 厘米；副花冠杯状，外轮裂片三角形，内轮狭线形，顶端略为膨大，钝形，无毛，比外轮长两倍；花粉块斜卵圆形，花粉块柄平展，着粉腺菱形，比花粉块小 4 倍。花期 5 月。

产于四川、贵州、云南丽江和昆明大普吉。生长于海拔 1000—2300 米的山地石罅中。模式标本采自云南丽江。

根入药，治癰疮。