

1957.

草质藤本；茎纤弱，草黄色，被微柔毛。叶线形或狭线状披针形，长 3.5—7.5 厘米，宽 2—3 毫米，顶端渐尖，基部楔形；中脉明显，侧脉模糊不清，叶面略具微毛，叶背无毛，边缘下卷；叶柄极短，或下面的长达 1 厘米。伞形聚伞花序腋生，着花不多，近无花序梗；花梗长达 9 毫米，近无毛；花萼裂片披针形，长约 5 毫米，急尖；花冠长达 5 厘米，基部椭圆形，在中间收缩，裂片长 2 厘米；副花冠外轮狭窄，长 1.5 毫米，内轮高出外轮两倍。蓇葖双生，线状披针形，长 8—9 厘米，直径约 3 毫米，向顶端渐狭，成长渐尖，基部楔形，外果皮草黄色，有细条纹，无毛；种子暗褐色，长圆形，长约 7 毫米，宽 3 毫米，顶端截形，基部圆形；种毛白色绢质，长约 2 厘米。花期 6 月，果期 7 月。

产于四川马尔康县。生长于海拔 2400 米山村附近。分布于泰国。模式标本采自泰国。

3. 金雀马尾参 (植物名实图考) 太子参 (云南楚雄)；普吉藤 (中国高等植物图鉴)

Ceropegia mairei (Lév.) H. Huber in Mem. Soc. Brot. **12**: 43. 1957; 中国高等植物图鉴, **3**: 520, 图 4993. 1974. — *Aristolochia mairei* Lév. in Bull. Geogr. Bot. **22**: 228. 1912. — *A. viridiflora* Lév. in Fedde, Rep. Spec. Nov. **12**: 99. 1913. — *A. viridiflora* var. *occlusa* Lév. l. c. **12**: 190. 1913. — *A. blinii* Lév. l. c. **12**: 287. 1913. — *Ceropegia balfouriana* Schltr. in Mot. Bot. Gard. Edinb. **8**: 18. 1913; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**: 998. 1936; Rehd. in Journ. Arn. Arb. **18**: 240. 1937; Tsiang in Sunyatsenia **4**: 89. 1939.

多年生草本；茎上部缠绕，下部直立，高达 35 厘米；根部丛生，肉质；茎部单独，曲折，近基部无叶，具微毛。叶直立展开，椭圆形或椭圆状披针形，长 0.9—4 厘米，在中间最宽处 4—12 毫米，顶端急尖或短渐尖，叶面及叶柄具微柔毛，叶背除中脉外无毛，边缘略为反卷。聚伞花序近无梗，少花；花梗长约 1 厘米，具微毛；花萼裂片狭披针形，长 5 毫米；花冠长约 3 厘米，近圆形，花冠筒近圆筒状，直径约 4.5 毫米，花冠喉部略为膨大，裂片舌状长圆形，内面具微毛，与花冠筒等长，长 1.2 厘米；副花冠杯状，外轮裂片三角形，内轮狭线形，顶端略为膨大，钝形，无毛，比外轮长两倍；花粉块斜卵圆形，花粉块柄平展，着粉腺菱形，比花粉块小 4 倍。花期 5 月。

产于四川、贵州、云南丽江和昆明大普吉。生长于海拔 1000—2300 米的山地石罅中。模式标本采自云南丽江。

根入药，治癰疮。