

Ceropegia teniana Hand.-Mazz. in Anz. Akad. Wiss. Wien Math. Nat. **61**: 167 (Pl. Nov. Sin. Fortsetz. 29). 1924, et Symb. Sin. **7**: 998. 1936; H. Huber in Mem. Soc. Brot. **12**: 40. 1957.

藤本；茎纤弱，长超过 80 厘米，被微硬长毛。叶宽卵圆形，长 3—4.5 厘米，顶端短渐尖，基部近截形，叶背除中脉外无毛；叶柄圆筒状，上面有深槽；侧脉约 3 对，小脉很密。聚伞花序伞形状，着花 1—8 朵；花序梗短，长约 1.3 厘米；花萼裂片钻状披针形，长 3—4 毫米，通常无毛；花冠长 1.5—2.3 厘米，花冠筒基部直径 3—4 毫米，椭圆状膨胀，黄色，裂片长 5 毫米，内面略具乳头状微毛，宽卵形，顶部内折而粘合；副花冠裂片成两轮，外轮三角状披针形，长 2.5 毫米，有疏长柔毛，内轮线形，长 2 毫米；着粉腺比花粉块小。花期 8 月。

产于云南。模式标本采自云南马鞍山。

7. 西藏吊灯花(中国高等植物图鉴) 底线参、蕤参(贵州) 图版 217

Ceropegia pubescens Wall. Pl. As. Rar. **2**: 81, t. 187. 1831; Wight, Contr. Bot. Ind. **32**. 1834; Decne. in DC. Prodr. **8**: 644. 1844; Tsiang in Sunyatsenia **4**: 91. 1939; H. Huber in Mem. Soc. Brot. **12**: 47. 1957, non E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 193. 1835.—*C. tsaiana* Tsiang in Sunyatsenia **4**: 130, Pl. 32. 1939.

草质藤本，高 30 厘米以上；须根丛生，肉质，长 6 厘米；茎草黄色，直径 1 毫米，几无毛，节间长 15—20 厘米。叶膜质，卵圆形，稀长圆形，长 4—15 厘米，宽 1—6 厘米，端部渐尖，基部近圆形，向叶柄下延，叶两面亮绿色，叶面被长柔毛，在中脉、侧脉和叶柄上较密；侧脉 5 对，展开，弧形上升，网脉多数，不甚清晰；叶柄长 3—4.5 厘米，顶端有丛生腺体约 10 个，上面具深槽。聚伞花序腋生，比叶为短，着花约 8 朵；花序梗长 2.5 厘米，几无毛；花梗线形，长 1 厘米，具微柔毛；花萼无毛，深 5 裂，裂片披针形，长 1.5 厘米，宽 5 毫米，顶端长渐尖；花冠黄色，膜质，基部椭圆状膨胀，长达 5 厘米，直径 5 毫米，裂片钻状披针形，端部内折而粘合；副花冠杯状，外轮扁平，顶端具刺毛，内轮具 5 个舌状片；雄蕊与雌蕊与属的特征相同；花粉块在每个药室中 1 个，顶端有透明的边缘。蓇葖线状披针形，长约 13 厘米，直径 2 毫米，向顶端渐窄；种子披针形，长 1 厘米，宽 1 毫米；种毛黄色绢质，长约 3.5 厘米。花期 7—9 月，果期 10—11 月。

产于四川、西藏、贵州和云南等省区。生长于海拔 2000—3200 米的杂木林中。分布于缅甸、印度、不丹、尼泊尔等处。模式标本采自尼泊尔。根可治小儿蛔虫。

8. 白马吊灯花(中国高等植物图鉴)

Ceropegia monticola W. W. Sm. in Not. Bot. Gard. Edinb. **12**: 198. 1920;

Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**: 998. 1936; Tsiang in Sunyatsenia **4**: 93, Pl. 27. 1939; H. Huber in Mem. Soc. Brot. **12**: 50. 1957.——*C. yunnanensis* Schltr. et Hand.-Mazz. in Anz. Akad. Wiss. Wien Math. Nat. **57**: 271. 1920.——*C. siamensis* Kerr in Kew Bull. **1939**: 465. 1939.

攀援草本植物,高达 15 厘米;茎分枝,被白色毛。叶宽卵形,长 1 厘米,顶端短渐尖,基部通常圆形,具长硬毛,边缘具缘毛,叶面具倒伏毛,叶背无毛。聚伞花序近伞形状,着花多朵;花序梗通常长 4—15 毫米,具长硬毛;花梗长 5—10 毫米,无毛;花萼长 5 毫米,裂片钻状线形,无毛;花冠长 3.8 厘米,外面无毛,花冠筒长 2.2 厘米,基部膨胀,喉部开展,裂片线状披针形,长 1.6 厘米,内面具白色长柔毛;副花冠外轮 10 裂,裂片披针形,渐尖,具缘毛,内轮舌状片比外轮裂片长两倍,直立。花期 4—8 月。

产于四川和云南。生长于海拔 2000 米以下的河旁山坡杂木林中。泰国也有分布。模式标本采自云南德钦白马山。

9. 巴东吊灯花(中国高等植物图鉴)

Ceropegia driophila Schneid. in Sargent, Pl. Wils. **3**: 349. 1916; Tsiang in Sunyatsenia **4**: 93. 1939.——*C. micrantha* Merr. op. cit. **3**: 257. 1937; Tsiang op. cit. **4**: 93. 1939.——*C. lucida* Wall. ssp. *driophila* (*dryophila*) (Schneid.) H. Huber in Mem. Soc. Brot. **12**: 55. 1957.

攀援半灌木,高 0.7—1.3 米;茎干后中空,圆柱状或略具细条纹,黄色,无毛。叶薄膜质,长圆形或卵圆状长圆形,长 2.5—6.5 厘米,基部宽 1—2.5 厘米,顶端渐尖,基部近心形,叶面具疏长毛,叶背无毛或几无毛,有缘毛;叶柄纤细,长 1—2.2 厘米。聚伞花序着花 2—8 朵;花序梗长 1—1.5 厘米,无毛;花梗纤弱,无毛,长 1—1.5 厘米,基部具线形小苞片,长 1—1.5 毫米;花萼裂片线形渐尖,长 2—3 毫米,花萼内面基部具有 5 个小腺体;花冠暗红色,全长 2.5 厘米,向基部椭圆状膨胀略为偏斜,直径 4 毫米,向上渐狭成筒直至喉部扩大,直径近 5 毫米,裂片舌状长圆形,长约 12 毫米,顶端粘合,有缘毛;副花冠外轮杯状,裂片三角状急尖,有缘毛,内轮线形;花粉块长圆状椭圆形,顶端有透明膜边,花粉块柄短,着粉腺比花粉块略短。花期 6 月。

产于湖北。生长于海拔 600—900 米的灌木丛中。模式标本采自巴东。

10. 狭叶吊灯花(中国高等植物图鉴)

Ceropegia stenophylla Schneid. in Sargent, Pl. Wils. **3**: 350. 1916.——*C. longifolia* Wall. ssp. *sinensis* H. Huber var. *sinensis*; H. Huber in Mem. Soc. Brot. **12**: 42. 1957, nom. illeg., p. p., syn. excl.