

Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**: 998. 1936; Tsiang in Sunyatsenia **4**: 93, Pl. 27. 1939; H. Huber in Mem. Soc. Brot. **12**: 50. 1957.——*C. yunnanensis* Schltr. et Hand.-Mazz. in Anz. Akad. Wiss. Wien Math. Nat. **57**: 271. 1920.——*C. siamensis* Kerr in Kew Bull. **1939**: 465. 1939.

攀援草本植物,高达 15 厘米;茎分枝,被白色毛。叶宽卵形,长 1 厘米,顶端短渐尖,基部通常圆形,具长硬毛,边缘具缘毛,叶面具倒伏毛,叶背无毛。聚伞花序近伞形状,着花多朵;花序梗通常长 4—15 毫米,具长硬毛;花梗长 5—10 毫米,无毛;花萼长 5 毫米,裂片钻状线形,无毛;花冠长 3.8 厘米,外面无毛,花冠筒长 2.2 厘米,基部膨胀,喉部开展,裂片线状披针形,长 1.6 厘米,内面具白色长柔毛;副花冠外轮 10 裂,裂片披针形,渐尖,具缘毛,内轮舌状片比外轮裂片长两倍,直立。花期 4—8 月。

产于四川和云南。生长于海拔 2000 米以下的河旁山坡杂木林中。泰国也有分布。模式标本采自云南德钦白马山。

9. 巴东吊灯花(中国高等植物图鉴)

Ceropegia driophila Schneid. in Sargent, Pl. Wils. **3**: 349. 1916; Tsiang in Sunyatsenia **4**: 93. 1939.——*C. micrantha* Merr. op. cit. **3**: 257. 1937; Tsiang op. cit. **4**: 93. 1939.——*C. lucida* Wall. ssp. *driophila* (*dryophila*) (Schneid.) H. Huber in Mem. Soc. Brot. **12**: 55. 1957.

攀援半灌木,高 0.7—1.3 米;茎干后中空,圆柱状或略具细条纹,黄色,无毛。叶薄膜质,长圆形或卵圆状长圆形,长 2.5—6.5 厘米,基部宽 1—2.5 厘米,顶端渐尖,基部近心形,叶面具疏长毛,叶背无毛或几无毛,有缘毛;叶柄纤细,长 1—2.2 厘米。聚伞花序着花 2—8 朵;花序梗长 1—1.5 厘米,无毛;花梗纤细,无毛,长 1—1.5 厘米,基部具线形小苞片,长 1—1.5 毫米;花萼裂片线形渐尖,长 2—3 毫米,花萼内面基部具有 5 个小腺体;花冠暗红色,全长 2.5 厘米,向基部椭圆状膨胀略为偏斜,直径 4 毫米,向上渐狭成筒直至喉部扩大,直径近 5 毫米,裂片舌状长圆形,长约 12 毫米,顶端粘合,有缘毛;副花冠外轮杯状,裂片三角状急尖,有缘毛,内轮线形;花粉块长圆状椭圆形,顶端有透明膜边,花粉块柄短,着粉腺比花粉块略短。花期 6 月。

产于湖北。生长于海拔 600—900 米的灌木丛中。模式标本采自巴东。

10. 狭叶吊灯花(中国高等植物图鉴)

Ceropegia stenophylla Schneid. in Sargent, Pl. Wils. **3**: 350. 1916.——*C. longifolia* Wall. ssp. *sinensis* H. Huber var. *sinensis*; H. Huber in Mem. Soc. Brot. **12**: 42. 1957, nom. illeg., p. p., syn. excl.